

Kích thước 80%



MEGA We care
FERROVIT

Thuốc bổ máu
hiệu quả & tiện dụng



Tài liệu dành cho công chúng

Dự phòng và điều trị các chứng THIỆU MÁU THIỂU SẮT

Cung cấp 3 thành phần cần thiết cho quá trình tạo máu (1)

● Sắt

● Acid Folic

● Vitamin B12



18/03/2014



Thành phần: Mỗi viên nang mềm gelatin chứa: Sắt Fumarate 162,00 mg, Folic acid 0,75 mg Vitamin B12 7,50 mcg. **Chỉ định:** Bổ sung sắt cho phụ nữ có thai và các chứng thiếu máu thiếu sắt. **Liều dùng:** Một viên nang hai lần mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của Bác sĩ. **Chống chỉ định:** Không chỉ định cho bệnh nhân có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc. **Thận trọng:** Sự hấp thu sắt bị ức chế bởi magiê trisilicate, các thuốc kháng acid và các loại thức ăn như trứng và sữa. Do vậy, nên sử dụng các chế phẩm bổ sung sắt trước 1 giờ hoặc 2 giờ sau khi sử dụng các loại thức ăn như trứng, sữa, trà, cà phê, lúa mì và ngũ cốc, các thuốc kháng acid hoặc các chế phẩm bổ sung calci. **Tác dụng phụ:** Hiếm gặp các rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, táo bón, tiêu chảy, đau bụng hoặc đau dạ dày, đau quặn bụng... Dùng các chế phẩm bổ sung sắt có thể làm phân có màu đen. **Tương tác thuốc:** Sắt: Dùng đồng thời sắt với các thuốc sau có thể làm giảm hiệu quả của sắt, như những chế phẩm có chứa calci và magesi, kể cả thuốc kháng acid và sản phẩm bổ sung khoáng chất, và bicarbonat, carbonat, oxalat hoặc phosphat, kẽm, tetracyclin, trientín và acetohydroxamic acid. Một số thuốc như ascorbic acid và citric acid thực sự có thể làm tăng sự hấp thu sắt. Ngoài ra, muối sắt cũng có thể làm giảm sự hấp thu của levodopa, methyldopa, mycophenolat mofetil, và penicilamin. Muối sắt cũng có thể làm giảm hiệu quả của levothyroxin. **Folic acid:** Tình trạng thiếu folat có thể do ảnh hưởng bởi một số thuốc như thuốc chống đông kinh, thuốc tránh thai uống, thuốc kháng lao, rượu và thuốc đối kháng acid folic như methotrexat, pyrimethamin, trimethoprim và sulfonamid. **Vitamin B12:** Hấp thu vitamin B12 từ đường tiêu hóa có thể bị giảm bởi neomycin, aminosalicylic acid, thuốc kháng histamin H2 và colchicin. Dùng đồng thời với thuốc tránh thai uống có thể làm giảm nồng độ vitamin B12 trong huyết thanh. **Lưu ý:** Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. **Nhà sản xuất:** Mega Lifesciences Public Company Limited 364 Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280, Thai Lan. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLD-BYT: xxxx/xx/QLD-TT, ngày...tháng...năm..., ngày...tháng...năm...in tài liệu.

(1) Drug Fact And Comparison 2007 Edition, 43-71

