


Bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa cần kiểm soát acid ở mức độ cao¹



pH>6 cần thiết cho giảm ly giải tiểu cầu và duy trì cục máu đông¹


N/A 18/7/14

Esomeprazole IV[#] đưa pH dịch vị lên trên 4 nhanh hơn²




2. Nghiên cứu chéo, ngẫu nhiên, 2 nhánh, trên 25 bệnh nhân so sánh thời gian pH dịch vị >4 trong 24 giờ của esomeprazole IV và pantoprazole IV liều tương đương

Esomeprazole IV[#] liều 80mg + 8mg/giờ duy trì pH>6 dài hơn, trong 12,6 giờ



3. Nghiên cứu chéo, dò liều, ngẫu nhiên, 5 nhánh, nhằm xác định liều của esomeprazole IV có khả năng duy trì pH>6 trong 24 giờ tối ưu



4. Nghiên cứu chéo, ngẫu nhiên, 3 nhánh so sánh khả năng duy trì pH>6 trong 24 giờ của lansoprazole IV 90mg bolus + 6mg/giờ trong 24 giờ và pantoprazole IV 80mg bolus + 8mg/giờ trong 24 giờ

[†]Tỉ lệ phần trăm thời gian các PPI duy trì pH > 6 trong 24 giờ (%) = Số giờ duy trì pH > 6 (giờ) / 24 (giờ)

#intravenous: tiêm tĩnh mạch

