


Duy trì giảm tái xuất huyết đến 30 ngày⁵



18/7/14



5. Nghiên cứu ngẫu nhiên trên 767 bệnh nhân ở 91 trung tâm, 16 quốc gia, nhằm đánh giá nguy cơ tái phát xuất huyết sau 72 giờ dùng esomeprazole IV

- Sử dụng Nexium đường tĩnh mạch trong 3 ngày đầu sau đó dùng Nexium 40mg đường uống trong 27 ngày được chứng minh là giảm tỉ lệ tái xuất huyết, tỉ lệ điều trị lại bằng nội soi, tỉ lệ phải truyền máu và thời gian nằm viện

Khuyến cáo quốc tế về xử trí xuất huyết tiêu hóa trên không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa (2010)⁶

"Bệnh nhân sau khi xuất viện nên được uống PPI liều đơn ngày 1 lần với liệu trình bao lâu tùy thuộc vào bệnh lý nền"

Mức độ đồng thuận: Thấp, 1c: Nên làm

Tài liệu tham khảo:

- Green FWJ et al. Gastroenterology 1978;74: 38-43.
- Clive H. Wider Smith et al. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2004; 20:1099-104
- K Rohss et al. Int. J of Clin. Pharma & Therapeu, Vol 45-No.6/2007 (345-354)
- Metz et al. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2006; 23:985-995
- Sung JJY et al. Ann Intern Med 2009; 150(7): 455-64
- Alan Barkun et al. Ann Intern Med. 2010;152: 101-113
- Thông tin kê toa Nexium