

Tài liệu quảng cáo dành cho công chúng

TV.PAIENT F

CÔNG THỨC:

- Paracetamol 650 mg, Ibuprofen 200 mg, Diphenhydramin hydroclorid 12,5 mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.

TRÌNH BÀY:

- Vỉ 10 viên nén dài bao phim - Hộp 10 vỉ.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng: nhức đầu, đau cơ, đau răng, đau do thấp khớp.
- Điều trị viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Mẫn cảm với các thuốc kháng histamin có cấu trúc tương tự. Mẫn cảm với aspirin hay các thuốc chống viêm không steroid khác. Người bệnh bị hen hay bị co thắt phế quản, rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, suy gan hoặc suy thận. Người bệnh bị suy tim sung huyết, bị giảm khối lượng tuần hoàn do thuốc lợi niệu hoặc bị suy thận. Không dùng trong trường hợp sốt xuất huyết.

- Người bệnh bị bệnh tạo keo. Người bệnh đang dùng thuốc chống đông coumarin, IMAO. Loét dạ dày - tá tràng tiến triển. Người bệnh thiếu hụt men Glucose - 6 - phosphat dehydrogenase. Phụ nữ có thai 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Phụ nữ cho con bú. Trẻ em dưới 15 tuổi.

THẬN TRỌNG KHI DÙNG:

- Dùng liên tục 2 tuần có thể gây suy gan, suy thận.
- Dùng liều cao gây tổn thương ở gan.

thường có là sốt, xét nghiệm máu bạch cầu trung tính tăng cao.

Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Người đã từng bị các phản ứng trên da nghiêm trọng do paracetamol gây ra thì không được dùng thuốc trở lại và khi đến khám chữa bệnh cần phải thông báo cho nhân viên y tế biết về vấn đề này.

- Uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol, nên tránh hoặc hạn chế uống rượu.

- Thận trọng khi dùng cho người có tiền sử dị ứng với NSAID, người có tiền sử loét dạ dày - tá tràng, thoát vị hoành hay xuất huyết tiêu hóa, người bệnh tim, cao huyết áp, hen suyễn, người cao tuổi. Thận trọng khi dùng cho người lái xe, vận hành máy móc vì ibuprofen có thể gây rối loạn thị giác.

- Thận trọng khi dùng chung với rượu hoặc các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương vì tác dụng an thần có thể tăng lên.

- Thận trọng khi dùng hoặc không dùng ở người phì đại tuyến tiền liệt, tắc bàng quang, hẹp môn vị, bệnh nhuộc cơ, tăng nhãn áp góc hẹp.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

- Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai 3 tháng đầu thai kỳ, tuyệt đối không dùng cho phụ nữ có thai 3 tháng cuối thai kỳ.

- Không dùng cho phụ nữ nuôi con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHILÁI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc gây buồn ngủ, thần trọng khi dùng nên người lái tàu xe và vận hành máy.