

- Dùng thuốc có thể gặp phải phản ứng phụ nghiêm trọng trên da mặc dù tỉ lệ mắc phải là không cao nhưng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng bao gồm: hội chứng Steven Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc: toxic epidermal necrolysis (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Triệu chứng của các hội chứng nêu trên được mô tả như sau:

+ Hội chứng Steven-Johnson (SJS): là dị ứng thuốc thể bong nước, bong nước khu trú tại các hốc tự nhiên: mắt, mũi, miệng, tai, bộ phận sinh dục, và hậu môn. Ngoài ra còn có thể kèm sốt cao, viêm phổi, rối loạn chức năng gan thận. Chẩn đoán hội chứng Steven-Johnson (SJS) khi có ít nhất 2 hoặc tự nhiên bị tổn thương.

+ Hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN): là thể dị ứng nặng nhất, gồm: Các tổn thương đa dạng ở da: ban dạng sởi, ban dạng tính hồng nhiệt, hồng ban hoặc các bong nước bồng bóng, các tổn thương nhanh chóng lan tỏa khắp người. Tổn thương niêm mạc mắt: viêm kết mạc, viêm kết mạc mủ, loét giác mạc. Tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa: viêm miệng, trợt niêm mạc miệng, loét hầu, họng thực quản, dạ dày, ruột. Tổn thương niêm mạc đường sinh dục, tiết niệu. Ngoài ra còn có các triệu chứng toàn thân trầm trọng như sốt, xuất huyết đường tiêu hóa, viêm phổi, viêm cầu thận, viêm gan...tỷ lệ tử vong cao 15-30 %.

+ Hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP): mụn mủ vô trùng nhỏ phát sinh trên nền hồng ban lan rộng. Tổn thương thường xuất hiện ở các nếp gấp như nách, bẹn và mặt, sau đó có thể lan rộng toàn thân. Triệu chứng toàn thân

mốc.

**TÁC DỤNG NGOẠI Ý:**

- Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau vùng thượng vị, tim nhanh, khô miệng, ăn ngon miệng hơn, tăng cân....Phản ứng quá mẫn: ngứa, nổi mẩn, mề đay, phù, co thắt phế quản. Rối loạn thần kinh: ngủ gà, nhức đầu, chóng mặt, suy nhược, rối loạn thị giác.....Rối loạn chức năng gan, suy thận. Rối loạn cấu tạo máu: mất bạch cầu hạt, thiếu máu tan huyết.

**\* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc:**

#### TƯƠNG TÁC THUỐC:

Thuốc ức chế Monoamin oxydase (IMAO) làm kéo dài và tăng tác dụng của Diphenhydramin. Không nên phối hợp với các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, các thuốc kháng Histamin khác với rượu. Ibuprofen làm tăng độc tính của kháng sinh nhóm Quinolon trên thần kinh trung ương, làm tăng độc tính của Methotrexat, làm tăng nồng độ Digoxin huyết tương. Làm giảm tác dụng bài xuất Natri niệu của Furosemid và các thuốc lợi tiểu khác. Không dùng phối hợp với các thuốc chống đông máu, Heparin, NSAID, thuốc có chứa Lithium.

#### LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Dùng đường uống. Dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liều sau: Người lớn: Mỗi lần uống 1 viên, ngày 3 lần.

**ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.  
BẢO QUẢN: NƠI KHÔ, KHÔNG QUÁ 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG. ĐỂ XA TẦM TAY CỦA TRẺ EM. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV/PHARM**  
27 Điện Biên Phủ, P.9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh  
Điện thoại: 0743.740234 - Fax: 0743.740239

*Handwritten signature and date: 4/4/2014*