

MẪU QUẢNG CÁO

# Maloxid P gel

## GIẢM KHÓ CHỊU, DỊU CỐN ĐAU TRONG VIÊM LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG

**CÔNG THỨC:** Gel aluminium phosphate 20% 12,38g. Tá được vừa đủ 1 gói. **CHỈ ĐỊNH:** Viêm thực quản, viêm dạ dày cấp và mạn tính, loét dạ dày - tá tràng, kích ứng dạ dày, các hội chứng thừa acid như rít bóng, ợ chua, và hiện tượng tiết nhiều acid, thì dù trong thời kỳ thai nghén. Những rối loạn của dạ dày do thuốc, do sai chế độ ăn hoặc sau khi dùng quá nhiều nicotine, cafe, kẹo, hoặc thức ăn quá nhiều gia vị. Biện chứng của thoát vị cơ hoành, viêm đại tràng (bệnh Crohn). **CÁCH DÙNG:** Uống MALOXID P GEL giữa các bữa ăn hoặc khi thấy khó chịu. Liều dùng thông thường 1 - 2 gói/lần, ngày 2 - 3 lần. Nếu triệu chứng không giảm với liều dùng 6 gói/ngày thì nên hỏi ý kiến bác sỹ. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Người bị mẫn cảm với nhôm, chế phẩm chứa nhôm hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh thận nặng. **THẬN TRỌNG:** Tránh điều trị lâu dài ở người bệnh suy thận. Nên hỏi ý kiến bác sỹ nếu có các triệu chứng đau kèm sốt hoặc nôn và các triệu chứng không mất đi sau 7 ngày. **THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:** Thời kỳ mang thai: các thuốc kháng acid thường được coi là an toàn, miễn là tránh dùng lâu dài liều cao. Thời kỳ cho con bú: mặc dù một lượng nhỏ nhôm được thải trừ qua sữa, nhưng nồng độ không đủ gây tác hại đến trẻ bú mẹ. Nên hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ trước khi dùng thuốc nếu đang có thai hoặc đang cho con bú. **TÁC DỤNG PHỤ:** Có thể xảy ra táo bón, nhất là ở những bệnh nhân ốm nằm liệt giường và/hoặc bệnh nhân cao tuổi. Nên uống nhiều nước trong những trường hợp này. Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Các thuốc kháng acid có thể làm tăng hoặc giảm tốc độ và mức độ hấp thu của các thuốc khác vì vậy không dùng thuốc kháng acid cùng lúc với các thuốc khác. Nên uống các thuốc khác trước hoặc sau thuốc kháng acid 1 - 2 giờ. Thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về các thuốc đang sử dụng để tránh tương tác thuốc. **QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:** Nếu trường hợp quá liều xảy ra, để nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược: XXXXXX/QLD-TT, ngày.....tháng.....năm.....;  
Ngày.....tháng.....năm.....in tài liệu.

Chỉ định trong trường hợp

**VIÊM THỰC QUẢN, VIÊM DẠ DÀY, LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG, KÍCH ỨNG DẠ DÀY, CÁC HỘI CHỨNG THỪA ACID.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR - 297/5 Lý Thường Kiệt - Q.11 - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam**  
ĐT: (84.8) 38650258, 38650436 - Fax: (84.8) 38650394 - Email: info@mekophar.com Website: www.mekophar.com



10/4/2014

CẤP HỒM ngày 04 tháng 04 năm 2014

GIẢM ĐỘC CHẤT LƯỢNG

HÓA-DƯỢC PHẨM

MEKOPHAR

QUẬN 11 TP. HỒ CHÍ MINH

DS. Nguyễn Thùy Vân