



- uống một lần mỗi ngày

CHỈ ĐỊNH

Điều trị thừa sắt mãn tính do truyền máu ở bệnh nhân người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên.

LIỀU DÙNG

10mg/kg/ngày

Liều dùng khởi đầu hàng ngày cho bệnh nhân truyền < 2 đơn vị hồng cầu mỗi tháng

20mg/kg/ngày

Liều dùng khởi đầu hàng ngày khuyến cáo

30mg/kg/ngày

Liều dùng khởi đầu hàng ngày cho bệnh nhân truyền > 4 đơn vị hồng cầu mỗi tháng

* Liều 40mg/kg/ngày có thể được xem xét trong trường hợp bệnh nhân dùng liều 30 mg/kg/ngày mà không đủ kiểm soát tình trạng bệnh.

CÁCH DÙNG: Exjade® được dùng khi đói, ít nhất 30 phút trước khi ăn.



- Exjade® dùng đường uống một lần một ngày với viên nén hòa tan trong 100 - 200ml nước, nước táo hay nước cam cho đến khi đạt được hỗn dịch mịn.
- Sau khi uống hỗn dịch, bất kỳ lượng cặn nào cũng đều phải được pha lại thành hỗn dịch với một ít nước hoặc trái cây và uống.
- Không được nhai hay nuốt nguyên cả viên.
- Không khuyến cáo phân tán trong nước có chứa carbonate (nước soda) hoặc sữa bởi sự tạo bọt và phân tán chậm.

[Signature]
27/5/2014