

GIẢM NHAI

Panadol[®]



Nguyen
7/5/19

Khó

THÀNH PHẦN: Panadol Extra Viên sủi chứa 500 mg Paracetamol và 65 mg Caffeine.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: Panadol Extra Viên sủi chứa paracetamol là một chất hạ sốt, giảm đau và caffeine là một chất tăng cường tác dụng giảm đau của paracetamol. Panadol Extra Viên sủi có hiệu quả trong: Điều trị đau nhẹ đến vừa và hạ sốt bao gồm: Đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau cơ xương, sốt và đau sau khi tiêm vaccin, đau sau khi nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau do viêm xương khớp.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Nên hòa tan Panadol Extra Viên sủi với ít nhất nửa cốc nước. Người lớn (kể cả người cao tuổi) và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Chỉ dùng đường uống. Nên dùng 500 mg paracetamol/ 65 mg caffeine đến 1000 mg paracetamol/ 130 mg caffeine (1 hoặc 2 viên) mỗi 4 đến 6 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 4000 mg/ 520 mg (paracetamol/ caffeine). Không dùng quá liều chỉ định. Không dùng với các thuốc khác có chứa paracetamol. Thời gian tối thiểu dùng liều lặp lại: 4 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng Paracetamol - Caffeine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Paracetamol - Caffeine chống chỉ định trên những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với paracetamol, caffeine hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc, bệnh nhân thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase.

THẬN TRỌNG VÀ CÁC LƯU Ý ĐẶC BIỆT: Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Trên các bệnh nhân đang bị các bệnh về gan, có sự gia tăng nguy cơ gây hại của paracetamol đối với gan. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này cho các bệnh nhân được chẩn đoán là suy gan hoặc suy thận. Nếu các triệu chứng còn dai dẳng, tham khảo ý kiến bác sĩ. Tránh dùng quá nhiều caffeine (ví dụ như từ cà phê, trà và một số đồ uống đóng hộp khác) trong khi đang dùng thuốc này. Để xa tầm tay trẻ em. Mỗi viên Panadol Extra Viên sủi chứa 427 mg natri. Thận trọng khi dùng thuốc này cho những bệnh nhân đang thực hiện chế độ ăn kiêng muối. Mỗi viên Panadol Extra Viên sủi chứa 50 mg sorbitol.