

VIỆNH CƠN ĐAU ĐẦU



Extra

Viên sủi



Không gây buồn ngủ ✓

Không dùng thuốc cho những bệnh nhân có bệnh di truyền hiếm gặp về không dung nạp fructose.

THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ: Khả năng sinh sản: Chưa có dữ liệu. **Phụ nữ mang thai:** Paracetamol: Các nghiên cứu trên người và động vật vẫn chưa xác định được bất kỳ nguy cơ nào của paracetamol đối với thai kỳ hoặc sự phát triển phôi thai. Caffeine: Không khuyến nghị dùng Paracetamol - Caffeine trong thời kỳ mang thai do có khả năng làm tăng nguy cơ sảy thai tự nhiên liên quan tới việc dùng caffeine. **Phụ nữ cho con bú:** Paracetamol và caffeine được bài tiết vào sữa mẹ. Paracetamol: Các nghiên cứu trên người với paracetamol ở liều dùng khuyến nghị không xác định được bất kỳ nguy cơ nào đối với phụ nữ cho con bú hoặc trẻ bú mẹ. Caffeine: Caffeine trong sữa mẹ có thể có khả năng có tác dụng kích thích đối với trẻ bú mẹ nhưng cho đến nay vẫn chưa quan sát thấy độc tính đáng kể.

TÁC DỤNG PHỤ: Paracetamol: Rất hiếm gặp: Giảm tiểu cầu; phản ứng quá mẫn, phản ứng dị ứng da như ban da, phù mạch, hội chứng Stevens-Johnson; co thắt phế quản ở các bệnh nhân nhạy cảm với aspirin và các NSAID khác; bất thường gan. Caffeine: Chưa biết: Bồn chồn, chóng mặt. Khi dùng liều khuyến nghị Paracetamol - Caffeine cùng với chế độ ăn uống có nhiều caffeine, sẽ gây ra các tác dụng phụ do quá liều caffeine như mất ngủ, thao thức, lo lắng, cáu kỉnh, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, hồi hộp. Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

SẢN XUẤT BỞI: Famar S.A (PLANT B'), ANTHOUSA, GREECE.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: xxxx/xx/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm ...

In tài liệu ngày ... tháng ... năm ... Code: PANEXTRAFF-H-140214

Panadol là nhãn hiệu đã được đăng ký của tập đoàn GlaxoSmithKline.