



Enterogermina chứa 2 tỉ bào tử lợi khuẩn *Bacillus clausii*



Enterogermina®
2 TỖ BẢO TỬ *BACILLUS CLAUSII*

Enterogermina
Men vi sinh cho
đường ruột khoẻ

SANOFI

TÊN THUỐC: Enterogermina 2 tỷ bào tử kháng đa kháng sinh *Bacillus clausii*. **THÀNH PHẦN ĐINH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG:** Thành phần chính: Mỗi ống nhựa 5ml chứa 2 tỷ bào tử *Bacillus clausii* kháng đa kháng sinh. Tã được: Nước cất tinh khiết. **DẠNG BẢO CHẾ:** Dạng hỗn dịch uống. Hộp 20 ống nhựa chứa 5ml thuốc. **ĐẶC TÍNH LÂM SANG:** Chỉ định điều trị: Điều trị và phòng ngừa rối loạn vi sinh đường ruột và bệnh lý kém hấp thu vitamin nội sinh. Điều trị hỗ trợ để phục hồi hệ vi sinh đường ruột bị ảnh hưởng khi dùng thuốc kháng sinh hoặc hóa trị liệu. Rối loạn tiêu hóa cấp và mạn tính ở trẻ em do nhiễm độc hoặc rối loạn vi sinh đường ruột và kém hấp thu vitamin.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: DÙNG CHO MỌI LỨA TUỔI Người lớn: 2 – 3 ống / ngày. Trẻ em: 1 – 2 ống/ ngày hoặc theo toa bác sĩ. Lắc kỹ ống thuốc trước khi dùng. Xoắn vắn phần trên để mở ống thuốc. Uống thuốc cách nhau đều đặn trong ngày (khoảng 3-4 giờ). Hãy xin ý kiến bác sĩ nếu bệnh tái phát hoặc nếu ghi nhận gần đây có sự thay đổi về đặc điểm của bệnh. Trong thời gian sử dụng kháng sinh, nên uống Enterogermina xen kẽ giữa các liều dùng kháng sinh. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. Lưu ý đặc biệt: Đối với dạng hỗn dịch có thể thấy các hạt nhỏ trong ống thuốc Enterogermina do sự tập hợp của các bào tử *Bacillus clausii*, điều đó có nghĩa là thuốc không bị thay đổi chất lượng. **THẬN TRỌNG KHI DÙNG:** Khi đang điều trị thuốc kháng sinh, nên uống Enterogermina xen kẽ vào giữa hai liều dùng kháng sinh. Để thuốc ngoài tầm tay trẻ em. Tương tác với các thuốc khác: Không có tương tác thuốc khi dùng chung với các thuốc khác. **Phụ nữ có thai và cho con bú:** Không chống chỉ định dùng Enterogermina cho phụ nữ có thai và cho con bú. **Tác động của thuốc tới lái xe và vận hành máy móc:** Enterogermina không gây ảnh hưởng gì đến người lái xe và vận hành máy móc. **Tác dụng không mong muốn của thuốc:** Một vài trường hợp phản ứng dị ứng như phát ban và mày đay đã được báo cáo. Hãy thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ sự xuất hiện của bất kỳ tác dụng không mong muốn nào không được liệt kê trong tờ hướng dẫn sử dụng này. Như bất kỳ thuốc nào, Enterogermina có thể gây một số tác dụng không mong muốn trên một số người. Sử dụng quá liều: Đến nay, không có trường hợp lạm dụng quá liều nào được báo cáo. **HẠN DÙNG:** 24 tháng. Khi mở ống thuốc ra phải dùng trong thời gian ngắn để tránh bị hỏng thuốc. **NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT KHI BẢO QUẢN:** Bảo quản ở nhiệt độ thấp hơn 30°C. **NHÀ SẢN XUẤT:** Sanofi-Aventis S.p.A., Viale Europa, 11, Origgio (VA), Italy. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. **THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:** Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam - 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, Tp. HCM. ĐT: (84-8) 3829 8526. Fax (84-8) 3914 4801. Chi nhánh Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (84-4) 35371835 - Fax: (84-4) 35371841.



Handwritten signature