

Cesyrrup

HỖ TRỢ TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG CHO TRẺ EM



12/15/2014



CÔNG THỨC: Chai 30ml: Sodium ascorbate tương đương acid ascorbic 600mg, Tá dược vừa đủ 30ml. Chai 60ml: Sodium ascorbate tương đương acid ascorbic 1200mg, Tá dược vừa đủ 60ml. **CHỈ ĐỊNH:** Phòng và điều trị bệnh do thiếu vitamin C ở trẻ sơ sinh và trẻ em. **CÁCH DÙNG:** Uống trong hoặc sau bữa ăn (không nên dùng thuốc trước khi đi ngủ). Uống ít nhất trong 2 tuần. Liều bổ sung: 1 lần/ngày. Liều điều trị: 2 - 4 lần/ngày. Trẻ em từ 2 - 6 tuổi: 5ml/lần. Trẻ em từ 7 - 12 tuổi: 10ml/lần. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc. Dùng vitamin C liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalate niệu và loạn chuyển hóa oxalate, bị bệnh thalassemia. **THẬN TRỌNG:** Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân bị oxalate niệu. Sự lờn thuốc có thể xảy ra khi sử dụng liều cao kéo dài. **THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:** Có thể sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú với liều dùng theo nhu cầu hàng ngày. Phụ nữ có thai: khi dùng vitamin C liều cao trong thời kỳ mang thai có khả năng gây hội chứng Scorbut ở trẻ sơ sinh. **TÁC DỤNG PHỤ:** Rối loạn tiêu hóa: nóng rất dạ dày, tiêu chảy. Tăng oxalate niệu. Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin. Kết hợp vitamin C và fluphenazine dẫn đến làm giảm nồng độ fluphenazine trong huyết tương. Dùng đồng thời tỷ lệ trên 200mg vitamin C với 30mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường dạ dày-ruột. Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B₁₂. Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc dược sỹ về những thuốc đang sử dụng. **QUÁ LIỀU & CÁCH XỬ TRÍ:** Những triệu chứng quá liều gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn. Nếu trường hợp quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhất để nhân viên y tế có phương pháp xử lý. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: XXXX/XX/QLD-TT, ngày.....tháng.....năm.....; Ngày.....tháng.....năm.....in tài liệu.



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR - 297/5 Lý Thường Kiệt, Q.11. TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (84.8) 38650258, 38650436 - Fax: (84.8) 38650394 - Email: info@mekophar.com - Website: www.mekophar.com

