

CÔNG TY ROHTO-MENTHOLATUM VIỆT NAM  
Địa chỉ: 16 VSIP, đường số 5, KCN VN-Singapore,  
Thuận An, Bình Dương  
ĐT: 0650 374 3355  
Fax: 0650 374 3358  
Ngày ... tháng ... năm ... in tài liệu

## Rohto Kháng Khuẩn

**Thành phần hoạt chất:** Sodium Sulfamethoxazole (520 mg);  
€- Aminocaproic Acid (260 mg); Chlorpheniramine Maleate  
(2,60 mg); Dipotassium Glycyrrhizinate (13,0 mg).

**Tác dụng không mong muốn:** Có thể gây dị ứng ở những bệnh nhân  
có cơ địa dị ứng thuốc.

### Lưu ý khi sử dụng thuốc:

- Hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng thuốc khi đau mắt nặng,  
có tiền căn dị ứng với thuốc nhỏ mắt, đang theo một quá trình điều trị.
- Trước khi dùng thuốc, chú ý: Dùng đúng liều quy định; trẻ em  
dùng thuốc dưới sự hướng dẫn của người lớn; không để mi mắt  
chạm vào miệng lọ để tránh lây nhiễm hoặc tránh làm vẩn đục  
thuốc do các chất tiết hoặc mầm bệnh, không dùng thuốc bị vẩn  
đục; không nhỏ thuốc khi mang kính tiếp xúc mềm; chỉ dùng thuốc  
này để nhỏ mắt. Một vài chất có thể kết tinh ở miệng lọ do điều  
kiện bảo quản. Nếu có, lau sạch bằng gạc trước khi dùng.
- Trong và sau khi dùng thuốc: Nếu dùng thuốc gây xung huyết, ngứa,  
sưng hay các triệu chứng khác, ngưng dùng và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc  
dược sĩ. Không dùng liên tục trong một thời gian dài. Ngưng dùng và  
hỏi ý kiến bác sĩ sau khi dùng vài ngày mà bệnh vẫn không đỡ.

Rohto An

Lẹo mắt

Viêm

