

do), Viêm mũi mắt.

Thành phần hoạt chất:
Sodium Sulfamethoxazole (520 mg);
ε- Aminocaproic Acid (260 mg);
Chlorpheniramine Maleate (2,60 mg);
Dipotassium Glycyrrhizinate (13,0 mg).

Tác dụng không mong muốn: Có thể gây dị ứng ở những bệnh nhân có cơ địa dị ứng thuốc.

Lưu ý khi sử dụng thuốc:

- Hơi ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng thuốc khi đau mắt nặng, có tiền căn dị ứng với thuốc nhỏ mắt, đang theo một quá trình điều trị.
- Trước khi dùng thuốc, chú ý: Dùng đúng liều quy định; trẻ em dùng thuốc dưới sự hướng dẫn của người lớn; không để mi mắt chạm vào miệng lọ để tránh lây nhiễm hoặc tránh làm vẩn đục thuốc do các chất tiết hoặc mầm bệnh, không dùng thuốc bị vẩn đục; không nhỏ thuốc khi mang kính tiếp xúc mềm; chỉ dùng thuốc này để nhỏ mắt. Một vài chất có thể kết tinh ở miệng lọ do điều kiện bảo quản. Nếu có, lau sạch bằng gạc trước khi dùng.
- Trong và sau khi dùng thuốc: Nếu dùng thuốc gây xung huyết, ngứa, sưng hay các triệu chứng khác, ngưng dùng và hơi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Không dùng liên tục trong một thời gian dài. Ngưng dùng và hơi ý kiến bác sĩ sau khi dùng vài ngày mà bệnh vẫn không đỡ.

Liều dùng và cách dùng: Nhỏ mắt 2-3 giọt/lần, 5-6 lần/ngày.

Chống chỉ định: Có tiền căn dị ứng với thuốc Sulfamide.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.




www.rohto.com.vn

CTY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM)

16 VSIP, đường số 5, KCN VN – Singapore, Thuận An, Bình Dương.

Tư vấn khách hàng: ĐT: (08) 3822 9322 • Email: enquiries@rohto.com.vn

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của cục Quản Lý Dược:/QLD-TT,
ngày tháng năm
Ngày tháng năm in tài liệu.



Nguyen
28/6/14