

**LIỀU DÙNG**

Signature
08/5/2014

	Nhiễm khuẩn ít nghiêm trọng	Nhiễm khuẩn vùng bụng, khung chậu ở nữ, và các nhiễm khuẩn nghiêm trọng khác
Người Lớn	1200-1800 mg/ngày chia thành 3 hoặc 4 liều bằng nhau	2400-2700 mg chia thành 3 hoặc 4 liều bằng nhau
Trẻ em (trên 1 tháng tuổi)	20 - 40 mg/kg/ngày chia thành 3 hoặc 4 liều bằng nhau	
Trẻ sơ sinh (dưới 1 tháng tuổi)	15 - 20 mg/kg/ngày chia thành 3 hoặc 4 liều bằng nhau	

**LIỀU DÙNG CHO CÁC CHỈ ĐỊNH ĐẶC BIỆT**

	Dalacin C tiêm
<i>Nhiễm liên cầu bê-ta tan huyết</i>	Điều trị nên tiếp tục ít nhất 10 ngày
<i>Viêm nhiễm vùng chậu - điều trị bệnh nhân nội trú</i>	Gentamycin 2,0mg/kg tiếp theo 1,5mg/kg 8 giờ một lần; tiếp tục sử dụng trong ít nhất 4 ngày và tiếp tục ít nhất 48 giờ sau khi tình trạng bệnh đã cải thiện
<i>Viêm não do toxoplasma trên bệnh nhân AIDS</i>	600 mg mỗi 6 giờ một lần trong hai tuần
<i>Viêm phổi do Pneumocystis carinii trên bệnh nhân AIDS</i>	600 đến 900 mg cứ 6 giờ một lần hoặc 900 mg cứ 8 giờ 1 lần.
<i>Dự phòng viêm nội tâm mạc ở bệnh nhân nhạy cảm với Penicillin</i>	600 mg truyền tĩnh mạch 1 giờ trước khi phẫu thuật.
<i>Dự phòng nhiễm khuẩn trong phẫu thuật đầu và cổ</i>	900mg pha loãng trong 1000mL nước muối sinh lý được dùng làm dung dịch rửa vùng đầu và cổ nhiễm khuẩn trước khi đóng vết thương