



Phổ Kháng Khuẩn Rộng

Sulbactam có tác dụng hiệp đồng với Ampicillin giúp mở rộng phổ kháng khuẩn của ampicillin trên các vi khuẩn kháng thuốc do sinh β lactamase

Vi khuẩn Gram (-) hiếu khí & kỵ khí

Haemophilus influenzae và *parainfluenzae* (cả hai dòng vi khuẩn sinh beta-lactamase và không sinh beta-lactamase)
Branhamella catarrhalis
Escherichia coli,
Klebsiella
Proteus (gồm cả hai loại indole+ và indole-)
Morganella morganii
Citrobacter
Enterobacter
Neisseria meningitidis
Neisseria gonorrhoeae
Vi khuẩn kỵ khí: *Bacteroides fragilis* và những vi khuẩn cùng họ

Vi khuẩn Gram (+)

Staphylococcus aureus
S. epidermidis (cả những vi khuẩn kháng với penicillin và một số vi khuẩn kháng với methicillin),
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus faecalis

Dự phòng nhiễm khuẩn sau phẫu thuật

Sulbactam natri/ampicillin IM/IV có thể dùng quanh cuộc mổ ở những bệnh nhân

- Phẫu thuật ổ bụng hoặc vùng chậu có thể bị nhiễm bẩn phúc mạc để giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn vết thương hậu phẫu.
- Dự phòng nhiễm khuẩn hậu sản trong những trường hợp chấm dứt thai kỳ hoặc mổ lấy thai

Handwritten signature and date: 2/6/14