



Chiết xuất Ginkgo biloba được tiêu chuẩn hóa (EGb 761)



Hiệu quả trong điều trị rối loạn chú ý và trí nhớ ở người lớn tuổi



Liều dùng: 1 viên x 3 lần mỗi ngày



THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên nén - **Hoạt chất chính:** Chiết xuất lá Ginkgo biloba được tiêu chuẩn hóa (EGb 761), chuẩn độ chứa 24% Ginkgo heterosides và 6% Ginkgolides-bilobalide. 40mg - **Tá dược:** Lactose monohydrate, Cellulose dạng vi tinh thể, bột bắp, Silice keo khan, Talc, Magnesium Stearate, Methylhydroxylpropylcellulose, Macrogol 400, Macrogol 6000, Dioxyde titane, Oxyde sắt đỏ. **DẠNG BÀO CHẾ:** Viên nén bao phim. **QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 30 viên nén đóng vỉ. **CHỈ ĐỊNH:** Thuốc này được khuyến dùng trong: - Rối loạn chú ý và trí nhớ ở người lớn tuổi. - Biểu hiện đau của viêm động mạch (đau thắt khi đi). - Một số rối loạn về thị giác (bệnh võng mạc do tiểu đường) và tai mũi họng (chóng mặt, ù tai, giảm thính lực), rối loạn tuần hoàn thần kinh cảm giác nghi do thiếu máu cục bộ. - Hội chứng Raynaud. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Dùng đường uống, 1 liều = 1 viên nén = 40mg chiết xuất tinh khiết. 1 viên nén x 3 lần mỗi ngày, uống vào bữa ăn. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. **THẬN TRỌNG:** Do trong thành phần của thuốc có lactose nên không dùng cho những người bị galactose huyết bẩm sinh, hội chứng kém hấp thu glucose hay galactose hoặc thiếu men lactase. **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Thực nghiệm trên động vật không thấy tác dụng sinh quái thai. Ở người, chưa có dữ liệu dịch tễ học chính xác. Tuy nhiên cho đến nay, chưa thấy có trường hợp dị dạng nào. Do chưa có dữ liệu lâm sàng phù hợp, không nên dùng khi đang có thai hoặc cho con bú. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa có dữ liệu. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Rất hiếm: rối loạn tiêu hóa, rối loạn ở da, nhức đầu. **Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.** **ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:** Chất điều hòa mạch máu trên hệ thống mạch máu. Tác dụng lưu biến học (tính chất anti-sludge và anti-PAF). Tác dụng bảo vệ trên chuyển hóa tế bào. Cải thiện dẫn truyền neurone. Đối kháng với sự sản xuất gốc tự do và sự peroxide hóa lipid màng tế bào. **ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:** Nghiên cứu trên động vật, sau khi uống Tanakan cho thấy có sự hấp thu nhanh và hoàn toàn (ở phần trên của đường tiêu hóa), sự thải qua CO₂ thở ra và qua nước tiểu, và thời gian bán hủy sinh học khoảng 4g30'. **QUÁ LIỀU:** Chưa có dữ liệu. **BẢO QUẢN:** Dưới 30°C

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

HẠN DÙNG: 22 tháng kể từ ngày sản xuất.

KHÔNG DÙNG QUÁ THỜI HẠN SỬ DỤNG GHI TRÊN BAO BÌ.

XUẤT XỨ: Pháp

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ

IPSEN Pharma - 65, quai Georges Gorse - 92100 Boulogne - Billancourt - Billancourt FRANCE

Nhà sản xuất: **Beaufour Ipsen industrie** - rue Ethe Virton - 28100 Dreux - FRANCE

Nhà Phân Phối: Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam

Lầu 4 - 5, Tòa nhà Maritime Bank, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

15/5/14

3 viên mỗi ngày

