

GYNOPHILUS®

Capsule vaginale

Viên nang đặt âm đạo.

Thuốc bán theo đơn.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÀNH PHẦN: Mỗi nang cỡ số 0 trong suốt có chứa 350 mg bột tương đương với tối thiểu 10^9 tế bào/g.

Công thức:

Hoạt chất: 341 mg/1 viên

Môi trường nuôi cấy *Lactobacillus casei rhamnosus* Döderleini tự nhiên dạng bột đông khô chứa tối thiểu 10^9 tế bào/gam.

Tá dược:

- Lactose monohydrate 5,59 mg/1 viên
- Magiê stearat 3,41 mg/1 viên
- Vỏ nang gelatin

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang đặt âm đạo.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: GYNOPHILUS® thường được sử dụng trong trường hợp:

- Tiếp tục điều trị sau trị liệu với thuốc kháng sinh hoặc kháng nấm âm đạo.
- Kết hợp GYNOPHILUS® đường đặt âm đạo với các thuốc điều trị nhiễm khuẩn âm đạo bằng đường uống hoặc đường tiêm khác (thường là các kháng sinh).

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: Thuốc chỉ dùng cho người lớn.

- Khởi đầu điều trị trong 7 ngày: 1 viên nang/lần x 2 lần/ngày.
- Điều trị duy trì trong 14 ngày tiếp theo, 1 viên/lần/ngày.
- Nhắc lại liều nếu cần.

CÁCH DÙNG THUỐC: Viên nang phải được nhúng trước vào nước để dễ dàng đưa thuốc vào âm đạo.



CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Không dùng cho trẻ em.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG:

Thận trọng khi sử dụng:

Trong suốt quá trình điều trị:

- Bệnh nhân vẫn có thể giao hợp, song tránh sử dụng bao cao su, chất diệt tinh trùng, hoặc màng latex mỏng tránh thai (do nguy cơ giảm tác dụng tránh thai).
- Nếu người bệnh không nhúng nang thuốc vào nước trước khi sử dụng, các phần mảnh nhỏ của thuốc có thể bị rơi vãi (bệnh nhân nên mặc quần lót hơi bó sát).

TƯƠNG TÁC VỚI THUỐC KHÁC VÀ NHỮNG DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không dùng cùng thuốc diệt tinh trùng.

PHỤ NỮ THỜI KỲ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ: GYNOPHILUS® có thể dùng được trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú.

TRẺ EM: Thuốc không được chỉ định trên đối tượng bệnh nhân này.

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa có báo cáo nào về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa có báo cáo nào về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ của bạn hoặc dược sĩ khi bạn gặp bất kỳ tác dụng không mong muốn nào trong quá trình sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU: Chưa có báo cáo nào về trường hợp quá liều. Để thuốc ở xa tầm với của trẻ nhỏ.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI BẢO QUẢN: Bảo quản thuốc ở nhiệt độ không quá 25°C.

ĐÓNG GÓI: Hộp 1 lọ chứa 14 viên nang trong lọ thủy tinh có nắp chlorobutyl được giữ bởi bao PVC có khả năng chống co rút.

NHÀ SẢN XUẤT: LABORATOIRES LYOCENTRE

24, avenue Georges Pompidou
B.P 429, 15004 AURILLAC Cedex, Pháp.

ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM BỞI:



Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
VPĐD Hyphens Pharma Pte. Ltd.

Hà Nội: 7/F, 315 Trường Chinh, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân.
Tel: (84-4) 3566 8560/61/62 - Fax: (84-4) 3566 8563
TP. HCM: 139F Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận.
Tel: (84-8) 3997 4462 - Fax: (84-8) 3997 4463

Handwritten signature/initials.