



SƠ ĐỒ TÓM TẮT KHUYẾN CÁO XỬ TRÍ XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA TRÊN KHÔNG DO TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA¹



Nexium là PPI* được chỉ định cho phòng ngừa tái xuất huyết sau khi điều trị nội soi xuất huyết cấp tính do loét dạ dày hay loét tá tràng²



3 ngày
80 mg bolus IV
8 mg/giờ truyền tĩnh mạch

+

27 ngày
Điều trị kháng tiết acid
bằng PPI đường uống



30 phút 0 giờ 10 giờ 20 giờ 30 giờ 40 giờ 50 giờ 60 giờ 70 giờ 72 giờ

* Proton-pump inhibitor (PPI): thuốc ức chế bơm proton
 1. Theo khuyến cáo xử trí xuất huyết tiêu hóa trên cấp tính không do tăng áp lực tĩnh mạch cửa của Hội Khoa học Tiêu hóa Việt Nam, 2009
 2. Thông tin kê toa Nexium
 Thông tin chi tiết sản phẩm xin xem trang sau
 Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý Dược – Bộ Y Tế: XXXX/XX/QLD-TT, ngày tháng năm
 Ngày in tài liệu: ngày tháng năm

Ngày 16/7/2014
Glay