



đưa, giun và phụ nữ đang cho con bú.

Tác động lên khả năng lái xe và sử dụng máy móc: Không ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và khả năng lái xe.

Tác dụng ngoại ý: xảy ra trong thử nghiệm lâm sàng ở <1% bệnh nhân: khó chịu ở bụng, tiêu chảy, đầy hơi; phát ban.

Tác dụng ngoại ý trong quá trình lưu hành thuốc trên thị trường: Rất hiếm gặp: giảm bạch cầu trung tính; quá mẫn bao gồm phản ứng phản vệ và phản ứng giống phản vệ; cơn co giật, chóng mặt; đau bụng; viêm gan, các chỉ số xét nghiệm chức năng gan không bình thường; hoại tử biểu bì nhiễm độc, hội chứng Stevens-Johnson, ngoại ban, phù mạch, mày đay, rụng tóc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều: Trường hợp dùng thuốc quá liều có thể có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Nhà sản xuất: OLIC (Thailand) Ltd.:

166 Moo 16 Bangpa-In Industrial Estate, Udomsorayuth Road, Bangpa-In District, Ayutthaya Province, THÁI LAN.

Phân phối bởi Vimedimex Bình Dương:


18 L1-2 VSIP đường số 3, khu CN VSIP Thủ Dầu 1 Bình Dương.

Thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ:

VPĐD Janssen Cilag - 35 Nguyễn Huệ, Q.1 - TP HCM.

ĐT: HCM: 84.838214828 - HN: 84.439363323

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.



Bé và cả gia đình bạn đều có thể nhiễm giun dễ dàng do có thể hít phải trứng giun trong không khí hoặc nhiễm giun qua da (kẽ tay, kẽ chân) khi tiếp xúc với đồ vật, đất cát...