

Fugacar®

Mebendazole 500mg

1 viên, diệt các loại giun
giun đũa, giun móc, giun tóc, giun kim



VỊ SOCOLA



VỊ TRÁI CÂY



KHÔNG VỊ

Thành phần: Mỗi viên nén chứa 500mg Mebendazole
Chỉ định: Nhiễm một hay nhiều loại giun đường ruột: giun tóc, giun móc, giun kim.

Liều dùng và cách dùng: Uống 1 viên duy nhất, có thể thuốc trước khi nuốt. Không cần áp dụng ăn kiêng hay dùng ở vùng có dịch tễ nhiễm giun đường ruột nặng, tẩy giun định kỳ 3-4 lần mỗi năm bằng Fugacar sẽ giảm đáng kể dịch

Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với thuốc hoặc thành phần thuốc. Không nên dùng Fugacar 500mg cho trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai 3 tháng đầu và bệnh nhân suy gan.

Thận trọng: Thận trọng khi dùng Fugacar 500mg cho trẻ dưới 12 tuổi. Trong quá trình lưu hành thuốc, các cơn co giật ở trẻ dưới 1 tuổi, được báo cáo với tần suất rất hiếm gặp, không dùng Fugacar 500mg cho trẻ quá nhỏ. Hiếm gặp các báo cáo loạn chức năng gan, viêm gan, giảm bạch cầu trung tính có ở những bệnh nhân được chỉ định mebendazole với liều cao. Viêm cầu thận được báo cáo khi sử dụng liều cao hơn mức báo cáo và điều trị kéo dài. Nên tránh sử dụng đồng thời metronidazole vì có sự gợi ý về khả năng có mối liên hệ chứng Stevens-Johnson/hoại tử nhiễm độc biểu bì với việc đồng thời mebendazole với metronidazole.

Phụ nữ mang thai và cho con bú: Mebendazole có biểu hiện độc thai và quái thai ở chuột cống và chuột nhắt ở liều độc nên dùng cho phụ nữ mang thai, đặc biệt trong 3 tháng đầu.