


HIGHTAMINE



THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

DL-Methionine.....	9,2mg
L-Leucine.....	9,15mg
L-Valine	5mg
L-Isoleucine.....	5mg
L-Threonine	5mg
L-Tryptophane.....	5mg
L-Phenylalanine.....	5mg
Lysine HCl.....	25mg
Tocopherol acetate 50%	10mg
Thiamine nitrat (Vitamin B1).....	2,5mg
Riboflavin (Vitamin B2).....	1,5mg
Nicotinamide (Vitamin PP).....	10mg
Pyridoxine HCl (Vitamin B6).....	5mg
Calcium pantothenate (Vitamin B5).....	2,5mg
Cyanocobalamin (Vitamin B12).....	0,5µg
Folic acid (Vitamin B9).....	100µg
Retinol palmitat (Vitamin A).....	1000IU
Ascorbic acid (Vitamin C).....	25mg
Ergocalciferol (Vitamin D).....	100IU

CHỈ ĐỊNH VÀ ĐIỀU TRỊ: Thuốc được chỉ định trong các trường hợp sau:

- **Duy trì thể lực**

- **Cung cấp chất dinh dưỡng cho:**

- * Trẻ nhỏ.
- * Người già.
- * Phụ nữ cho con bú.
- * Bệnh nhân đang trong thời kỳ dưỡng bệnh.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 1 viên / lần x 3 lần / ngày

Trẻ em: 1-2 viên / ngày

Liều dùng có thể điều chỉnh phụ thuộc vào tuổi và các triệu chứng bệnh

TÁC DỤNG PHỤ:

Có thể xảy ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn, táo bón, ỉa chảy, ngứa, đỏ da.

THẬN TRỌNG:

Dùng thuốc đúng liều và đúng hướng dẫn sử dụng.

Cha mẹ cần theo dõi cẩn thận khi trẻ nhỏ dùng thuốc.

Không nên dùng quá 8.000 IU vitamin A mỗi ngày vì vitamin A đã được cung cấp đầy đủ trong các bữa ăn.

Nếu các triệu chứng không được cải thiện sau khi sử dụng thuốc lâu ngày, cần phải tham vấn bác sĩ hoặc dược sĩ.

TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Dùng được khi lái xe và vận hành máy móc.

Trường hợp có thai và cho con bú: Trong trường hợp có thai hay nghi ngờ có thai không nên dùng quá liều chỉ định. Dùng quá liều chỉ định Vitamin A (8 000 IU / ngày) có thể gây dị dạng bào thai.

Phụ nữ cho con bú: không nên dùng quá liều chỉ định.

Thông báo cho bác sĩ bất kỳ tác dụng nào gặp phải khi dùng thuốc. Nếu cần thông tin xin hỏi thêm bác sĩ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Trẻ em dưới 1 tuổi

QUÁ LIỀU:

Hiện chưa thấy có hiện tượng quá liều khi sử dụng ở liều điều trị. Nếu có quá liều xảy ra, việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng và nâng đỡ cơ thể do chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

BẢO QUẢN:

Để trong bao bì kín, để ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

Nhà sản xuất

ĐÓNG GÓI:

10 viên nang/vỉ, 10 vỉ/hộp

Handwritten signature and date: 2/6/2014