

mebendazole
trẻ em dưới 2 tuổi. Các con có giết ở trẻ dưới 1 tuổi
được báo cáo với tần suất rất hiếm gặp, không nên sử
dùng Fugacar 500mg cho trẻ quá nhỏ. Hiếm gặp các
bảo, cáo về rối loạn chức năng gan, viêm gan, giảm
bạch cầu trung tính có hội phục ở những bệnh nhân
được chỉ định mebendazole với liều chuẩn. Viêm cầu
thận được báo cáo khi sử dụng liều cao hơn mức
khuyến cáo và điều trị kéo dài. Nên tránh sử dụng
đồng thời với metronidazole vì có sự gợi ý về khả năng
có mối liên hệ giữa hội chứng Stevens-Johnson/hoại tử
nhiệm độc biểu bị với việc sử dụng đồng thời meben-
dazole với metronidazole.
Phụ nữ mang thai và cho con bú: Mebendazole gây
độc thai và quái thai ở chuột cống và chuột nhắt ở liều

đơn. Không nên dùng cho phụ nữ mang thai, đặc biệt
trong 3 tháng đầu thai kỳ và phụ nữ đang cho con bú.
Tác động lên khả năng lái xe và sử dụng máy móc:
Không ảnh hưởng đến sự tỉnh táo và khả năng lái xe.
Tác dụng ngoại ý: xảy ra trong thử nghiệm lâm sàng ở
<1% bệnh nhân: khó chịu ở bụng, tiêu chảy, đầy hơi;
phát ban.
Tác dụng ngoại ý trong quá trình lưu hành thuốc
trên thị trường: rất hiếm gặp: giảm bạch cầu trung
tính; quá mẫn bao gồm phản ứng phân vệ và phản
ứng giống phản vệ; cơn co giật; chóng mặt; đau bụng;
viêm gan; các chỉ số xét nghiệm chức năng gan không
bình thường; hoại tử biểu bì nhiệm độc, hội chứng
Stevens-Johnson, ngoại ban, phù mạch, mày đay, rụng

tóc. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ
không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quả liều: Trường hợp dùng thuốc quá liều có thể có
triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy.

Nhà sản xuất: OLLC (Thailand) Ltd.

Địa chỉ: 166 Moo 16 Bangpa-in Industrial Estate,
Udomsorayuth Road, Bangpa-in District, Ayutthaya
Province, THAILAND. Phân phối bởi Vimedimex Bình
Dương, 18 L1-2 VSIP đường số 3, khu CN VSIP Thủ
Đầu 1 Bình Dương.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông tin sản phẩm, vui lòng liên hệ:

VPPD Janssen Cilag - 35 Nguyễn Huệ, Q.1 - TPHCM.
ĐT: HCM: 84.838214828 - HN: 84.439363323

