



TÀI LIỆU THÔNG TIN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

- DUNG DỊCH NHỎ MẮT ĐIỀU TRỊ BỆNH GLAUCOMA VÀ TĂNG NHÃN ÁP -

Rx Thuốc bán theo đơn

Dung dịch nhỏ mắt**TAFLOTAN®**

<Tafluprost>

Santen

TAFLOTAN® là dung dịch nhỏ mắt trong, không màu, vô khuẩn, chứa tafluprost 0,0015%, “1-Methylethyl (5Z)-7-[(1R, 2R, 3R, 5S)-2-[(1E)-3,3-difluoro-4-phenoxy-1-butenyl]-3,5-dihydroxy-cyclopentyl]-5-heptenoate”.

[MÔ TẢ]

Nhãn hiệu	Dung dịch nhỏ mắt TAFLOTAN®
Hoạt chất	Tafluprost
Hàm lượng 7lọ 2,5 mL	0,0375 mg
Thành phần không hoạt tính	Polysorbate 80, glycerin đậm đặc, disodium edetate hydrate, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, benzalkonium chloride, sodium hydroxide, acid hydrochloric và nước tinh khiết
pH	5,7 – 6,3
Áp lực thẩm thấu	1,0 – 1,1
Mô tả	Dung dịch nhỏ mắt trong, không màu, vô khuẩn

[DẠNG BÀO CHẾ]

Dung dịch nhỏ mắt

[CHỈ ĐỊNH]

Làm giảm áp lực nội nhãn cao ở bệnh nhân glaucoma góc mở hoặc tăng nhãn áp.

[CHỐNG CHỈ ĐỊNH]

Chống chỉ định dùng thuốc này ở bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

[LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG]**Thuốc tra mắt**

- Nhỏ một giọt vào mắt bị bệnh, một lần mỗi ngày trong buổi tối.
- Không nhỏ thuốc quá một lần mỗi ngày, vì nhỏ thường xuyên hơn có thể làm giảm tác dụng hạ áp lực nội nhãn (IOP).
- Khoảng 2 giờ đến 4 giờ sau khi nhỏ thuốc lần đầu tiên, áp lực nội nhãn bắt đầu giảm, với tác dụng tối đa đạt được sau 12 giờ.
- TAFLOTAN® có thể được sử dụng cùng với các thuốc nhỏ mắt khác để làm cho áp lực nội nhãn được hạ thấp hơn. Nếu cần sử dụng hơn một loại thuốc nhỏ mắt, mỗi loại thuốc sẽ được nhỏ cách nhau ít nhất 5 phút.

[CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG]

Khi sử dụng dung dịch thuốc nhỏ mắt TAFLOTAN® cần lưu ý các điều dưới đây: