

Viên đặt phụ khoa

Vengizol

Kháng Viêm, Chống Nấm



Vengizol

Kháng Viêm, Chống Nấm

Metronidazol.....200mg
Dexamethason acetat.....0,5mg

Thành phần:
Chlorphenicol.....100.000 IU
Tá dược: Tá dược béo no vừa đủ.....1viên

CHỈ ĐỊNH: Các trường hợp viêm nhiễm phụ khoa do nhiều nguyên nhân khác nhau:
- Viêm âm đạo do vi khuẩn sinh mủ thông thường
- Viêm âm đạo kèm huyết trắng

- Viêm âm đạo do nấm Trichomonas
- Viêm âm đạo do nấm Candida albicans
- Viêm âm đạo do nguyên nhân hỗn hợp: nhiễm Trichomonas và nấm men.

LIỀU DÙNG:

Đặt một viên/lần, vào buổi tối trước khi đi ngủ, dùng liên tục trong 10 ngày liền. Trong trường hợp nhiễm nấm, thời gian điều trị có thể lên tới 20 ngày.

CÁCH DÙNG:

Những viên thuốc vào nước khoảng 10 - 15 giây trước khi đặt sâu vào âm đạo. Khi đặt thuốc và trong vòng 15 phút sau khi đặt, tốt nhất bệnh nhân nên ở tư thế nằm.

Trong trường hợp quên thuốc, đặt ngay thuốc nếu có thể. Tuy nhiên, nếu thời điểm này quá gần với thời gian dùng viên tiếp theo, bỏ qua liều quên và đặt viên tiếp theo như bình thường.

CHÔNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

THẬN TRỌNG: Người sử dụng thuốc khi có bất kỳ dấu hiệu quá mẫn nào. Trong trường hợp bị nhiễm nấm âm đạo, khi làm vệ sinh nên sử dụng loại xà phòng có pH trung tính hoặc kiềm (do pH acid tạo thuận lợi cho nấm Candida phát triển).

Tương tác thuốc

Vengizol là thuốc điều trị tại chỗ, sự hấp thu của thuốc hầu như không đáng kể. Do đó, hiếm xảy ra tương tác khi dùng đồng thời Vengizol với các thuốc khác.

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những thuốc đang sử dụng.

Phụ nữ có thai và cho con bú

Việc sử dụng thuốc an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú vẫn chưa được chứng minh. Do đó không nên dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu của thai kỳ và thời kỳ cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:

- Vengizol có thể gây dị ứng.

- Rất hiếm khi có cảm giác bị kim châm hoặc kích ứng tại chỗ trong vài ngày đầu điều trị.

- Tác dụng phụ toàn thân: Giống như tất cả các thuốc điều trị tại chỗ, một lượng nhỏ các thành phần trong thuốc có thể hấp thụ qua niêm mạc.

Thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Trong trường hợp vô tình uống nhầm thuốc với liều lượng lớn, cần báo ngay cho nhân viên y tế để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 28° C, tránh ánh sáng trực tiếp.

TIÊU CHUẨN: TCCS.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc



ĐIỀU TRỊ:

- * Viêm âm đạo do vi khuẩn
- * Viêm âm đạo do Trichomonas
- * Viêm âm đạo do nấm



Nhà sản xuất:
Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim

Số giấy tiếp nhận hồ sơ thông tin thuốc

ngày.....tháng.....năm.....
In tài liệu ngày.....tháng.....năm.....

Phân phối bởi:
CÔNG TY TNHH TM & DƯỢC PHẨM HÙNG VIỆT
Lô 46 M2 Khu đô thị Yên Hòa - Trung Yên - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: M.Bác: 043.7821.780 / M.Trung: 0511.3790979 / M.Nam: 083.8664605

14/5/14