



Hoạt chất
**human chorionic
gonadotropin (hCG)**
* chiết xuất từ nước tiểu
phụ nữ mang thai¹

✓ Có hoạt tính
hormon
Lutein (LH)¹



Pregnyl®

- ✓ Ở Nữ giới, hCG được chỉ định:¹
- * **Gây rụng trứng** do không rụng trứng hay nang trứng không chín trong trường hợp hiếm muộn
 - * **Chuẩn bị nang trứng** để chọc hút trong các phác đồ gây quá kích thích buồng trứng có kiểm soát
 - * **Hỗ trợ giai đoạn hoàng thể** ở phụ nữ kích thích rụng trứng có kiểm soát

- ✓ Ở Nam giới, hCG được chỉ định:¹
- * **Suy sinh dục** do suy hormon hướng sinh dục
 - * **Hiếm muộn kết hợp với suy giảm tinh trùng** và/ hoặc tinh dịch tự phát
 - * **Dậy thì trễ kết hợp với suy chức năng tuyến yên**
 - * **Tinh hoàn ẩn**, không do tắc nghẽn về mặt giải phẫu học

Bảo quản:¹

- * Bảo quản ở 2°C – 15°C, tránh ánh sáng

Cách dùng:¹

- * Sau khi pha dung môi vào ống thuốc đông khô, dung dịch Pregnyl vừa được pha cần được tiêm bắp chậm hoặc tiêm dưới da

Tính chất và hàm lượng thuốc:¹

- * Ống thuốc Pregnyl chứa bột tiêm 1500 IU tương đương 1500 đơn vị quốc tế hCG
- * Ống thuốc Pregnyl chứa bột tiêm 5000 IU tương đương 5000 đơn vị quốc tế hCG

Chống chỉ định:¹

- * Mẫn cảm với human gonadotropins hoặc bất kỳ thành phần tá dược nào
- * Có hoặc nghi ngờ có khối u phụ thuộc hormone sinh dục như carcinoma buồng trứng, vú, tử cung ở nữ giới hoặc carcinoma vú ở nam giới
- * Dị dạng ở cơ quan sinh dục không thích hợp để mang thai
- * U xơ tử cung không thích hợp để mang thai
- * Suy tuyến sinh dục nguyên phát

Tài liệu tham khảo: 1. Thông tin kê toa sản phẩm