



PANADOL TRẺ EM VIÊN SỦI

Giảm đau – Hạ sốt
Vị ngọt dễ uống

★ **THÀNH PHẦN:** PANADOL Trẻ em – V

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: PANADOL Trẻ em

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Liều dùng: Ghi trên nhãn là dựa trên

1



Cách dùng: Hòa tan viên thuốc trong nước. Cách dùng này chỉ được sử dụng cho trẻ từ 7-12

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉ định ở

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT: Hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hoặc bệnh nhân suy gan hoặc suy thận. Để

THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ: Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú: Phát triển của bào thai. Phân loại như thuốc gây quái thai hoặc những ảnh hưởng đến thai nhi. Phát hiện có bất kỳ nguy cơ nào đối với

TÁC DỤNG PHỤ: Rối loạn máu và hệ tiêu hóa, phù mạch, hội chứng Steven Johnson.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn.

SẢN XUẤT BỞI: GlaxoSmithKline Aus

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quản lý thuốc

In tài liệu ngày ... tháng ... năm Công ty

Panadol là nhãn hiệu đã được đăng ký

Nguyen
15/1/14