

Viên sủi màu trắng chứa paracetamol 250 mg.

– Viên sủi có tác dụng hạ sốt, giảm đau nhanh trong đau răng, đau đầu, đau tai, sau tiêm vaccine, triệu chứng cảm cúm.

15 mg paracetamol / kilogram cân nặng / một lần.

Tuổi	Cân nặng	Liều
7-10 tuổi	22-32 kg	1-1 ½ viên (tối đa 6 viên/24 giờ)
10-12 tuổi	32-41 kg	1 ½ - 2 viên (tối đa 8 viên/24 giờ)

Uống với một cốc nước nguội. Có thể uống cùng với nước hoa quả. Dùng thuốc mỗi 4-6 giờ nếu cần, liều tối đa 4 lần/24 giờ. Thuốc chỉ dùng cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên.

Bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với paracetamol hoặc bất kỳ tá dược nào.

Cảnh báo: Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Cần thận trọng dùng Panadol trẻ em trên nền thuốc ngoài tầm với của trẻ. Nếu các triệu chứng vẫn còn dai dẳng, hỏi ý kiến bác sĩ.

Mang thai: Các nghiên cứu trên người và động vật với paracetamol không xác định được nguy cơ đối với việc mang thai hoặc sự phát triển của bào thai. **Phụ nữ cho con bú:** Những nghiên cứu trên người với paracetamol không cho thấy có tác động xấu trực tiếp hoặc gián tiếp lên bào thai. **Phụ nữ cho con bú:** Những nghiên cứu trên người với paracetamol không cho thấy có tác động xấu trực tiếp hoặc gián tiếp lên bào thai. Paracetamol qua được hàng rào nhau thai và được bài tiết vào sữa mẹ.

Biến chứng: Rất hiếm: giảm tiểu cầu. Rối loạn hệ miễn dịch: Rất hiếm: phản ứng quá mẫn, phản ứng mẫn cảm trên da như: hội chứng Stevens-Johnson. Rối loạn hệ hô hấp, ngực và trung thất: Rất hiếm: co thắt phế quản. Rối loạn gan mật: Rất hiếm: rối loạn chức năng gan mật.

Không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

Pharmacia Pty Ltd, 82 Hughes Avenue Ermington NSW 2115, Australia

THỜI KHI DÙNG.

Ngày cấp phép của Cục Quản Lý Dược: xxxx/xx/QLD, ngày ... tháng ... năm

Mã: PANKIDIFF- WEB- 101213.

Thương hiệu của tập đoàn GSK.