

chứa 500 mg Paracetamol và 65 mg Caffeine.

Viên sủi chứa paracetamol là một chất hạ sốt, giảm đau và caffeine là một chất tăng cường tác dụng giảm đau của paracetamol. Có hiệu quả trong: điều trị đau nhẹ đến vừa và hạ sốt bao gồm: đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau răng, đau sau khi nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau do viêm xương khớp.

Đã tan Panadol Extra Viên sủi với ít nhất nửa cốc nước. Người lớn (kể cả người cao tuổi) và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: chỉ dùng 1 viên paracetamol/ 65 mg caffeine đến 1000 mg paracetamol/ 130 mg caffeine (1 hoặc 2 viên) mỗi 4 đến 6 giờ. Liều tối đa hàng ngày: 4000 mg paracetamol/ 260 mg caffeine. Không dùng quá liều chỉ định. Không dùng với các thuốc khác có chứa paracetamol. Thời gian tối thiểu dùng liều

paracetamol - Caffeine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Paracetamol - Caffeine chống chỉ định trên những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với bất kỳ tá dược nào của thuốc, bệnh nhân thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase.

Chống chỉ định: Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Trên các bệnh nhân đang bị các bệnh về gan, paracetamol đối với gan. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này cho các bệnh nhân được chẩn đoán là suy gan hoặc suy thận, tham khảo ý kiến bác sĩ. Tránh dùng quá nhiều caffeine (ví dụ như từ cà phê, trà và một số đồ uống đóng hộp khác) và tránh dùng cho trẻ em. Mỗi viên Panadol Extra Viên Sủi chứa 427 mg natri. Thận trọng khi dùng thuốc này cho những bệnh nhân có bệnh thận. Mỗi viên Panadol Extra Viên sủi chứa 50 mg sorbitol. Không dùng thuốc cho những bệnh nhân có bệnh di truyền hiếm gặp

Sinh sản: Chưa có dữ liệu. **Phụ nữ mang thai:** Paracetamol: Các nghiên cứu trên người và động vật vẫn chưa xác định được tác dụng đối với thai kỳ hoặc sự phát triển phôi thai. Caffeine: Không khuyến nghị dùng Paracetamol - Caffeine trong thời kỳ mang thai. **Phụ nữ cho con bú:** Paracetamol và caffeine được bài tiết vào sữa mẹ. Dùng paracetamol ở liều dùng khuyến nghị không xác định được bất cứ nguy cơ nào đối với phụ nữ cho con bú hoặc trẻ em. Trẻ em có thể có khả năng có tác dụng kích thích đối với trẻ bú mẹ nhưng cho đến nay vẫn chưa quan sát thấy độc tính đáng kể.

Tác dụng phụ: giảm tiểu cầu, phản ứng quá mẫn, phản ứng dị ứng da như: ban da, phù mạch, hội chứng Stevens-Johnson, co thắt phế quản với aspirin và các NSAID khác, bất thường gan. **Caffeine:** chưa biết: bồn chồn, chóng mặt. Khi dùng liều khuyến nghị có thể ăn uống có nhiều caffeine, sẽ gây ra các tác dụng phụ do quá liều caffeine như mất ngủ, thao thức, lo lắng, cáu kỉnh, đau

không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

, ANTHOUSA, GREECE.

TRƯỚC KHI DÙNG.

Ngày cấp thuốc của Cục Quản Lý Dược: xxxx/xx/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm ...

Mã: PANEXTRAFF- WEB- 101213

Logo của tập đoàn GSK.