



PANADOL EXTRA EFFERVESCENT:

▪ Giảm đau – Hạ sốt

THÀNH PHẦN: Panadol Extra Viên sủ

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ: Panadol Extra Viên sủ paracetamol. Panadol Extra Viên sủ cơ xương, sốt và đau sau khi tiêm và

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Nên dùng đường uống. Nên dùng 500 mg ngày: 4000 mg/ 520 mg (paracetamol) lặp lại: 4 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng Paracetamol với paracetamol, caffeine hoặc với b

THẬN TRỌNG VÀ CÁC LƯU Ý ĐẶC BIỆT: Hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) có sự gia tăng nguy cơ gây hại của paracetamol suy thận. Nếu các triệu chứng còn đang trong khi đang dùng thuốc này. Để x đang thực hiện chế độ ăn kiêng muối về không dung nạp fructose.

THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ: Khả năng bất kỳ nguy cơ nào của paracetamol thai do có khả năng làm tăng nguy cơ Paracetamol: Các nghiên cứu trên ng bú mẹ. Caffeine: Caffeine trong sữa m

TÁC DỤNG PHỤ: Paracetamol: rất hi phế quản ở các bệnh nhân nhạy cảm Paracetamol - Caffeine cùng với chế đầu, rối loạn tiêu hóa, hời hộp:

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng kh

SẢN XUẤT BỞI: Famar S.A (PLANT B'

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THU

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký qu

In tài liệu ngày... tháng ... năm Co

Panadol là nhãn hiệu đã được đăng



Nguyen...
13/8/14

Viên sủi chứa paracetamol là một chất hạ sốt, giảm đau và caffeine là một chất tăng cường tác dụng giảm đau của paracetamol. Viên sủi có hiệu quả trong: điều trị đau nhẹ đến vừa và hạ sốt bao gồm: đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau răng, đau sau khi nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau do viêm xương khớp.

etamol - Caffeine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Paracetamol - Caffeine chống chỉ định trên những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn
ít kỳ tá dược nào của thuốc, bệnh nhân thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase.

Chú ý: Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Trên các bệnh nhân đang bị các bệnh về gan, acetaminophen có thể gây độc cho gan. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này cho các bệnh nhân được chẩn đoán là suy gan hoặc suy thận, tham khảo ý kiến bác sĩ. Tránh dùng quá nhiều caffeine (ví dụ như từ cà phê, trà và một số đồ uống đóng hộp khác) khi dùng thuốc này. Tránh dùng thuốc này cho trẻ em. Mỗi viên Panadol Extra Viên Sủi chứa 427 mg natri. Thận trọng khi dùng thuốc này cho những bệnh nhân có bệnh thận. Mỗi viên Panadol Extra Viên sủi chứa 50 mg sorbitol. Không dùng thuốc cho những bệnh nhân có bệnh di truyền hiếm gặp về chuyển hóa đường.

Sinh sản: Chưa có dữ liệu. **Phụ nữ mang thai:** Paracetamol: Các nghiên cứu trên người và động vật vẫn chưa xác định được mối liên quan giữa việc sử dụng paracetamol trong thời kỳ mang thai với nguy cơ dị tật bẩm sinh. Caffeine: Không khuyến nghị dùng Paracetamol - Caffeine trong thời kỳ mang thai. **Phụ nữ cho con bú:** Paracetamol và caffeine được bài tiết vào sữa mẹ. Sử dụng paracetamol ở liều dùng khuyến nghị không xác định được bất cứ nguy cơ nào đối với phụ nữ cho con bú hoặc trẻ em. Caffeine có thể có khả năng có tác dụng kích thích đối với trẻ bú mẹ nhưng cho đến nay vẫn chưa quan sát thấy độc tính đáng kể.

êm gặp: giảm tiểu cầu, phản ứng quá mẫn, phản ứng dị ứng da như: ban da, phù mạch, hội chứng Stevens-Johnson, co thắt với aspirin và các NSAID khác, bất thường gan. **Caffeine:** chưa biết: bồn chồn, chóng mặt. Khi dùng liều khuyến nghị độ ăn uống có nhiều caffeine, sẽ gây ra các tác dụng phụ do quá liều caffeine như mất ngủ, thao thức, lo lắng, cáu kỉnh, đau

ông mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

, ANTHOUSA, GREECE.

ỚC KHI DỪNG.

g cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: xxxx/xx/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm ...

de: PANEXTRAEFF- WEB- 101213

ký của tập đoàn GSK.