



Thành phần: Mỗi viên nang gelatin mềm chứa: Vitamin E (dạng d- α -tocopheryl acetate) 400 IU. **Tá dược:** Dầu đậu tương. **Tác dụng:** Vitamin E có tác dụng như là một chất chống oxy hoá, giúp cho quá trình bảo vệ các tế bào bị tổn thương gây ra bởi quá trình oxy hoá của các gốc tự do. **Chỉ định:** Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu Vitamin E. **Liều lượng:** Điều trị và dự phòng thiếu Vitamin E: 1 viên Vitamin E 400 IU, 1 lần mỗi ngày sau bữa ăn hoặc theo ý kiến bác sĩ. **Chống chỉ định:** Giảm prothrombin do thiếu hụt Vitamin K. **Tương tác thuốc:** Vitamin E có thể làm thay đổi hiệu lực của Vitamin K lên các yếu tố đông máu dẫn đến sự gia tăng hiệu ứng giảm prothrombin huyết đối với warfarin và có thể làm giảm đáp ứng huyết học đối với sắt ở trẻ em mắc chứng thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin E có thể làm tăng tác dụng của thuốc chống đông, warfarin hay các thuốc làm loãng máu loại Indandione. Vitamin E cũng có thể làm tăng tác dụng ngăn cản sự ngưng kết tiểu cầu của Aspirin, Cholestyramine, Colestipol, Isoniazid và dầu khoáng có thể làm giảm sự hấp thu của Vitamin E. Sucralfate can thiệp vào sự hấp thu vitamin E. Neomycin có thể làm giảm hiệu lực của Vitamin E. **Thận trọng/Cảnh báo:** Việc bổ sung liều cao Vitamin E nên được ngưng khoảng 1 tháng trước khi phẫu thuật và có thể tiếp tục khi đã phục hồi lại sức khỏe sau cuộc phẫu thuật. **Phụ nữ mang thai và đang cho con bú:** Tránh dùng Enat cho phụ nữ có thai và cho con bú. **Tác dụng phụ:** Vitamin E không gây tác dụng phụ nào khi dùng ở liều thông thường. Tuy nhiên khi dùng Vitamin E ở liều cao có thể gây buồn nôn, khó chịu ở da dày hoặc tiêu chảy, nứt lưỡi, viêm thành quản hoặc lão đảo chóng mặt. Những dấu hiệu này thường hiếm gặp nhưng khi có các tác dụng phụ thì chủ yếu là những dấu hiệu về tiêu hóa. Khi xuất hiện các dấu hiệu nêu trên nên tham khảo ý kiến Bác sĩ. **Lưu ý:** **Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.** Nhà sản xuất: **Mega Lifesciences Public Company Limited**, 384 Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn, 10280 Thái Lan. Để biết thêm thông tin về sản phẩm xin vui lòng liên hệ: **VPBD Mega Lifesciences Public Company Limited** tại Việt Nam HCM: 364 Cộng Hòa, Tòa nhà E-Town.Q. Tân Bình. ĐT: (08) 38123 166 - Hà Nội: (04) 3664 3957. Email: cuscare@megawecare.com. Website: www.megawecare.com.vn. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký QC thuốc của Cục QLD-BYT: xxx/xx/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm Visa: VN-15978-12