



06/6/2014



Vitamin E có tác dụng như là một chất chống oxy hoá, giúp cho quá trình bảo vệ các tế bào bị tổn thương gây ra bởi quá trình oxy hoá Vitamin E 400 IU, 1 lần mỗi ngày sau bữa ăn hoặc theo ý kiến bác sĩ. **Chống chỉ định:** Giảm prothrombin do thiếu hụt Vitamin K. **Tương** rmbin huyết đối với warfarin và có thể làm giảm đáp ứng huyết học đối với sắt ở trẻ em mắc chứng thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin E có g tác dụng ngăn cản sự ngưng kết tiểu cầu của Aspirin. Cholestyramine, Colestipol, Isoniazid và dầu khoáng có thể làm giảm sự hấp thu o: Việc bổ sung liều cao Vitamin E nên được ngưng khoảng 1 tháng trước khi phẫu thuật và có thể tiếp tục khi đã phục hồi lại sức khỏe itamin E không gây tác dụng phụ nào khi dùng ở liều thông thường. Tuy nhiên khi dùng Vitamin E ở liều cao có thể gây buồn nôn, khó có các tác dụng phụ thì chủ yếu là những dấu hiệu về tiêu hóa. Khi xuất hiện các dấu hiệu nêu trên nên tham khảo ý kiến Bác sĩ. **Lưu ý:** istrial Estate, Samutprakarn, 10280 Thái Lan. Để biết thêm thông tin về sản phẩm xin vui lòng liên hệ: **VPĐD Mega Lifesciences Public** Email: cuscare@megawecare.com. Website: www.megawecare.com.vn. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký QC thuốc của Cục QLD-BYT: