

THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa Vitamin C 1,000 mg (từ Ascorbic acid 400mg, Natri Ascorbat 350mg, Canxi Ascorbat 400mg). **CHỈ ĐỊNH:** điều trị tình trạng thiếu hụt vitamin C. **LIỀU DÙNG:** một viên mỗi ngày, uống trong bữa ăn hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** bệnh nhân thiếu hụt G6PD, tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và rối loạn chuyển hoá oxalat, bị bệnh thalassemia. Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. **CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG:** bệnh nhân đái tháo đường và bệnh nhân dễ bị sỏi thận tái phát (ví dụ như bệnh nhân lọc máu) không nên dùng liều cao trong thời gian dài (một số nghiên cứu cho rằng nên dùng liều ít khoảng 100mg/ ngày). **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** phân loại thai kỳ là A/C (nếu dùng liều vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày. Vitamin C phân bố trong sữa mẹ. **TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG VẬN HÀNH MÁY MÓC TÀU XE:** không có báo cáo. **TÁC DỤNG PHỤ:** dùng liều cao vitamin C có thể gây tiêu chảy, rối loạn tiêu hoá, tăng oxalat niệu và tạo sỏi canxi oxalat thận. Thông báo cho bác sĩ về những tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** không dùng vitamin C trong vòng 1 tháng sau khi bắt đầu điều trị bằng desferrioxamine, do có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ngộ độc sắt. Dùng liều cao vitamin C có thể làm tăng nồng độ ethinylestradiol huyết ở phụ nữ đang uống thuốc ngừa thai. Dùng vitamin C cho bệnh nhân đang dùng fluphenazine để điều trị chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực (bipolar disorder) có thể làm giảm hiệu quả cũng như nồng độ fluphenazine huyết tương. Dùng vitamin C đồng thời với warfarin có thể làm giảm hoạt tính của warfarin. Vitamin C có thể giúp tăng hấp thu sắt ở bệnh nhân thiếu sắt. **QUÁ LIỀU:** triệu chứng gồm sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn. **BẢO QUẢN:** bảo quản ở nơi khô, mát dưới 25° C, tránh ánh sáng chiếu trực tiếp. **HẠN DÙNG:** 2 năm kể từ ngày sản xuất. **TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM:** tiêu chuẩn nhà sản xuất. **TRÌNH BÀY:** Lọ 30v viên, 60 viên và 150 viên. *Lưu ý: đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên hộp. Không dùng thuốc khi có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào trên viên thuốc. Để xa tầm tay trẻ em.*

Sản xuất dưới sự nhượng quyền của: **MEGA LIFESCIENCES (AUSTRALIA) PTY. LTD. VICTORIA 3175, AUSTRALIA**

Bởi **Mega Lifesciences Public Company Limited**
515/1 Moo 4, Soi 8, Bangpoo Industrial Estate, Pattana 3
Road, Phraeksa, Mueang, Samut Prakarn 10280, Thái Lan

Nhập khẩu & phân phối bởi:

Công ty Dược phẩm Hapharco

Tiếp Thị bởi: **VPĐD Mega Lifesciences Public Company Limited**
364 Cộng Hòa, phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
Website: www.megawecare.com.vn

MEGA We care



VISA: VN-14257-11