


CHOLESTIN

THUỐC DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP:
Cholesterol máu cao
Phòng ngừa xơ vữa động mạch
Phòng ngừa cao huyết áp
Điều trị hỗ trợ bệnh béo phì



Văn phòng:

253 Dường Sĩ Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
 Tel: (0511) 3757676 - Fax: (0511) 376 0127

Chăm sóc khách hàng:

Tel: (0511) 376 0130

Nhà máy:

Đường số 7-KCN Hòa Khánh, Tp. Đà Nẵng
 Tel: (0511) 3734678 - Fax: (0511) 3760127

www.danapha.com

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc
 của Cục Quản lý dược: _____

Ngày _____ tháng _____ năm _____

Ngày _____ tháng _____ năm _____ in tài liệu

Thành phần: Cho 1 viên bao phim

- Ngưu tất (Radix Archyranthis bidentatae)
- Nghệ (Rhizoma curcuma longae)
- Rutin
- Tá dược (Lactose monohydrat, tinh bột mì, PVP K30, Magiesi stearat, Talc, Aerosil) vừa đủ...

Chỉ định: Thuốc dùng trong các trường hợp

- Điều trị cholesterol máu cao
- Phòng ngừa xơ vữa động mạch, cao huyết áp
- Điều trị hỗ trợ trong bệnh béo phì

Liều lượng - Cách dùng: Dùng theo chỉ dẫn của
 thầy thuốc hoặc dùng liều trung bình là

- Người lớn:
 Liều khởi đầu: mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
 Liều duy trì: mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần
- Trẻ em:
 Liều khởi đầu: mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần.
 Liều duy trì: mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần.

Chống chỉ định:

- Người bị mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Tác dụng không mong muốn:

- Chưa ghi nhận được trường hợp nào xảy ra tác dụng không mong muốn trong khi dùng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

- Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai và cho con bú.

- 500 mg Tương ứng với 200 mg cao khô
- 500 mg Tương ứng với 5 mg hỗn hợp Curcumin
- 100 mg

• 1 viên

Lái xe và vận hành máy móc:

- Chưa ghi nhận được ảnh hưởng nào trên người lái xe hay vận hành máy móc.

Tương tác thuốc: Không có thông tin

Quá liều: Không có thông tin

Khuyến cáo:


- Uống thuốc sau bữa ăn.
- Không dùng thuốc quá hạn ghi trên hộp, hoặc thuốc có nghi ngờ về chất lượng.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin về thuốc, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc Dược sĩ.

Trình bày - Bảo quản

- Thuốc đóng trong lọ 50 viên, hộp 1 lọ, có kèm tờ hướng dẫn sử dụng.
- Để thuốc nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM

Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất
 Tiêu chuẩn áp dụng : TCCS



[Handwritten signature]
 29/11/2014