

Pantnew

PANTOPRAZOL 40mg

THÀNH PHẦN

Công thức cho 1 lọ Pantnew:

Pantoprazol (dưới dạng Pantoprazol natri

$C_{16}H_{14}F_2N_6NaO_4S \cdot H_2O$): 40mg

Công thức cho 1 ống dung môi NaCl:

NaCl 90 mg

Nước cất pha tiêm vừa đủ 10 ml

DƯỢC LỰC HỌC

Pantoprazol là thuốc ức chế bơm proton. Thuốc vào ống tiết acid của tế bào thành dạ dày để được chuyển thành chất sulfenamid dạng có hoạt tính, dạng này liên kết không thuận nghịch với enzym $H^+/K^+ - ATPase$ (còn gọi là bơm proton) có trên bề mặt tế bào thành dạ dày, gây ức chế enzym này, ngăn cản bước cuối cùng của sự bài tiết acid vào lòng dạ dày. Vì vậy, Pantoprazol có tác dụng ức chế dạ dày tiết acid cơ bản và cả khi dạ dày bị kích thích do bất kỳ tác nhân nào.

Tác dụng của Pantoprazol phụ thuộc vào liều dùng, thời gian ức chế bài tiết acid dịch vị kéo dài hơn 24 giờ, mặc dù nửa đời thải trừ của Pantoprazol ngắn hơn nhiều (0,7 – 1,9 giờ).

Sau liều uống khởi đầu 40mg Pantoprazol, bài tiết acid dịch vị bị ức chế trung bình 51% sau 2,5 giờ. Uống Pantoprazol mỗi ngày một lần 40 mg trong 7 ngày làm giảm tới 85% bài tiết acid dạ dày. Bài tiết acid dạ dày trở lại bình thường trong vòng 1 tuần sau khi ngừng Pantoprazol và không có hiện tượng tăng tiết acid trở lại (rebound).

Ngoài ra, Pantoprazol còn có thể loại trừ *Helicobacter pylori* ở dạ dày ở người bị loét tá tràng và/hoặc viêm thực quản trào ngược bị nhiễm vi khuẩn đó. In vitro, Pantoprazol làm giảm số lượng *Helicobacter pylori* gấp hơn 4 lần ở pH 4.

CHỈ ĐỊNH

- Loét dạ dày – tá tràng
- Bệnh trào ngược dạ dày – thực quản

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không nên dùng cho các trường hợp có tiền sử mẫn cảm với Pantoprazol.

LIỀU DÙNG

Liều Pantoprazol tĩnh mạch trung bình là 1 lọ (40 mg Pantoprazol) mỗi ngày

Liều tối đa có thể đến 6 lọ/ngày chia làm nhiều lần

CÁCH DÙNG

- Để tiêm tĩnh mạch: Bơm 10ml dung dịch muối sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) vào lọ Pantoprazol 40mg, tiêm tĩnh mạch chậm ít nhất 2 phút.
- Để truyền tĩnh mạch: Bơm 10ml dung dịch muối sinh lý (dung dịch NaCl 0,9%) vào lọ, sau đó pha loãng Pantoprazol với 100 ml nước muối sinh lý hay 100 ml Glucose 5% hay 100 ml Glucose 10%, truyền tĩnh mạch ít nhất 15 phút.
- Không pha Pantoprazol với dung môi nào khác ngoài các dung môi kể trên
- Dung dịch đã pha chế cần được dùng trong vòng 12 giờ sau khi pha chế

THẬN TRỌNG

- Trước khi điều trị với Pantoprazol, phải loại trừ khả năng loét dạ dày ác tính hoặc viêm thực quản ác tính vì có thể nhất thời làm lu mờ các triệu chứng của bệnh loét ác tính, do đó có thể làm chậm chẩn đoán
- Hiện chưa có kinh nghiệm về việc điều trị với Pantoprazol ở trẻ em

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Kinh nghiệm lâm sàng về sử dụng pantoprazol cho phụ nữ có thai còn hạn chế. Trong các nghiên cứu về sinh sản ở động vật, các độc tính trên bào thai ở dạng nhẹ được ghi nhận ở liều trên 5mg/kg. Chưa biết thuốc có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Do đó, không sử dụng pantoprazol cho phụ nữ có thai và cho con bú.

TÁC DỤNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Hiện chưa rõ tác dụng của thuốc khi dùng cho người lái xe hay vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

- Pantoprazol có thể làm giảm độ hấp thu của các thuốc khác dùng đồng thời mà độ hấp thu phụ thuộc vào pH (vd: Ketoconazol)
- Hoạt chất của Pantoprazol được chuyển hóa ở gan nhờ hệ enzym cytochrome P450. Tuy nhiên, trên lâm sàng chưa thấy tương tác đáng kể trong những thử nghiệm đặc biệt với một số thuốc hoặc hợp chất có tính chất nói trên, như carbamazepin, cafein, diazepam, diclofenac, digitoxin, ethanol, glibenclamid, metoprolol, nifedipin, phenytoin, theophylin. Warfarin và các thuốc tránh thai dùng đường uống

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Điều trị với Pantoprazol thỉnh thoảng có thể gây nhức đầu hay tiêu chảy nhẹ và những trường hợp hiếm gặp hơn như buồn nôn, đau bụng trên, đầy hơi, ban da, ngứa và choáng váng
 - Vài trường hợp cá biệt hiếm xảy ra như phù nề, sốt, viêm tĩnh mạch huyết khối
- Thông báo cho bác sĩ nếu gặp tác dụng không mong muốn

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Hiện chưa biết triệu chứng khi dùng quá liều ở người. Trong trường hợp dùng quá liều và có triệu chứng nhiễm độc lâm sàng, áp dụng các quy tắc giải độc thông thường

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp 01 lọ Pantnew và 01 ống NaCl 0,9% 10ml, kèm theo hướng dẫn sử dụng.

Tiêu chuẩn – Hạn dùng – Bảo quản

- Tiêu chuẩn: TCCS
- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

TIÊU CHUẨN: TCCS

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

BẢO QUẢN: ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng

SẢN XUẤT BỞI:

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I- PHAR-BACO

ĐC: 160 Tôn Đức Thắng- Hà Nội

ĐT: (04) 38454561, Fax: 84-4-8237460