



PANADOL

Giảm đau - Hạ sốt

THÀNH PHẦN: Paracetamol 500 mg.

CHỈ ĐỊNH: Panadol chứa paracetamol, giảm đau, đau bụng kinh, đau họng, đau cơ khớp. b) Hạ sốt.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: Người lớn: Uống 1 viên khi cần. Chỉ dùng đường uống. Liều dùng: Khoảng cách liều tối thiểu: 4 giờ. Trẻ em: 10 - 15 mg/kg cân nặng, mỗi lần 4 - 6 lần trong 24 giờ. Khoảng cách liều dùng thuốc cho trẻ em dưới 6 tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Chống chỉ định paracetamol.

THẬN TRỌNG VÀ CÁC LƯU Ý ĐẶC BIỆT: Hội chứng hoại tử da nhiễm độc (paracetamol đối với gan trên những trường hợp trước khi dùng thuốc này. Nếu các triệu chứng này xảy ra, ngưng ngay việc dùng thuốc này.

THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ: Khả năng gây độc của paracetamol đối với thai kỳ và nguy cơ nào đối với phụ nữ cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: F. Johnson, có thể phát hiện ở các bệnh nhân phải khi dùng thuốc.

SẢN XUẤT BỞI: STERLING DRUG (M)

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quản lý thuốc

In tài liệu ngày ... tháng ... năm Công ty

Panadol là nhãn hiệu đã được đăng ký



19/6/19 Aug