

AGIPAROFEN®

Thành phần: Mỗi viên nén 2 lớp chứa:

Paracetamol	325mg
Ibuprofen	200mg
Tá dược vđ	1 viên.

Chỉ định:

- Giảm đau, kháng viêm trong các trường hợp đau cơ khớp do chấn thương, thấp khớp, viêm thần kinh như đau lưng, vẹo cổ, bong gân, căng cơ quá mức, gãy xương, trật khớp, đau sau giải phẫu...
- Đau bụng kinh, đau nhức cơ quan vận động...
- Thuốc được chỉ định cho các trường hợp đau không đáp ứng với trị liệu pháp Paracetamol hoặc Ibuprofen đơn độc.

Liều lượng và cách dùng:

- Uống sau bữa ăn.
- Dùng cho người lớn:
- Trường hợp cấp tính: 1 - 2 viên/lần, 3 lần/ngày.
- Bệnh mạn tính: 1 viên/lần, 3 lần/ngày.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Loét dạ dày - tá tràng tiến triển.
- Người bệnh thiếu hụt men G-6-PD.
- Quá mẫn với aspirin hay các thuốc chống viêm không steroid khác.
- Người bệnh đang được điều trị bằng thuốc chống đông coumarin.
- Người bị hen hay bị co thắt phế quản, rối loạn chảy máu.
- Suy gan hoặc suy thận nặng.
- Người bệnh bị suy tim sung huyết, bị giảm khối lượng tuần hoàn do thuốc lợi niệu hoặc bị suy thận (tăng nguy cơ rối loạn chức năng thận).
- Lupus ban đỏ rải rác (nguy cơ bị phản ứng màng não nhẹ).
- Trẻ em dưới 12 tuổi, phụ nữ có thai trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối, phụ nữ cho con bú.

Tác dụng phụ và phản ứng có hại:

- Rối loạn tiêu hóa: Buồn nôn, ợ mửa, khó tiêu, đau dạ dày, đau thượng vị, xuất huyết ngầm hoặc lộ rõ, rối loạn vận động.
- Rối loạn thần kinh: Nhức đầu, suy nhược, chóng mặt.
- Phản ứng mẫn cảm: Ở da (nổi mẩn, ngứa), ở hệ hô hấp (đôi khi có thất phế quản ở người dị ứng với aspirin và các thuốc chống viêm không steroid khác), phù.
- Rối loạn chức năng gan (hiếm): Tăng tạm thời transaminase.
- Rối loạn chức năng thận: Tiểu ít, suy thận.
- Rối loạn máu: Mất bạch cầu hạt, thiếu máu tán huyết. Trong một số rất hiếm trường hợp có thể có thiếu máu cả ba dòng, giảm bạch cầu trung tính

và giảm bạch cầu.

- Ibuprofen ức chế kết tụ tiểu cầu nên có thể làm cho thời gian chảy máu kéo dài.
- Rối loạn thị giác.
- Giảm thính lực.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Cẩn thận khi dùng trong ba tháng đầu của thai kỳ.
- Tuyệt đối không dùng trong quý ba của thai kỳ (nguy cơ nhiễm độc thai: ở thận và tim phổi thai nhi, với sự đóng sớm ống động mạch) và vào cuối thai kỳ (do nguy cơ xuất huyết ở mẹ và cả con do kéo dài thời gian chảy máu).
- Ibuprofen vào sữa mẹ rất ít, không đáng kể. Không thấy có tác dụng không mong muốn đối với trẻ bú mẹ có uống thuốc paracetamol.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Người điều khiển phương tiện giao thông và sử dụng máy móc cần lưu ý về nguy cơ bị chóng mặt khi dùng thuốc.

Những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc:

- Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP).
- Khi bắt đầu điều trị, cần theo dõi thật kỹ sự bài tiết nước tiểu và chức năng thận ở bệnh nhân bị suy tim, xơ gan và hư thận, ở bệnh nhân đang dùng thuốc lợi tiểu, bị suy thận mạn tính và đặc biệt ở người già.
- Theo dõi những bệnh nhân đã có tiền sử loét dạ dày-tá tràng, thoát vị hoành hoặc xuất huyết tiêu hóa.
- Cẩn thận khi sử dụng ở bệnh nhân có bệnh tim và tăng huyết áp.

Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



AGIMEXPHARM

Sản xuất tại: CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM

27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Nhà máy: K. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

ĐT: 076.3857300 - 3856966 Fax: 076.3857301

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

24 Đường số 3, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, TP. HCM

ĐT: 08.39624777 - 39624888 Fax: 08.39624999

Email: agimexpharmcnhcm@gmail.com

Trang 2

TP Long Xuyên, ngày 19 tháng 06 năm 2014

GIÁM ĐỐC
PGD Quản lý chất lượng
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
TP. LONG XUYẾN - T. AN GIANG
DS. Phạm Thị Bích Thủy