

AGICETAM[®]
Piracetam 400 - 800mg

Thành phần:

Mỗi viên nang 400mg chứa:

- Piracetam400 mg
- Tá dược vđ1 viên.

Mỗi viên nén dài bao phim 800mg chứa:

- Piracetam800mg
- Tá dược vđ1 viên.

Chỉ định: Điều trị triệu chứng chóng mặt.

- Ở người cao tuổi: Suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung hoặc thiếu tỉnh táo, thay đổi khí sắc, rối loạn hành vi, kém chú ý đến bản thân, sa sút trí tuệ do nhồi máu não nhiều ổ.
- Đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp. Cần chú ý tuổi tác và mức độ nặng nhẹ lúc đầu của tai biến là các yếu tố quan trọng nhất để tiên lượng khả năng sống sót sau tai biến đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp.
- Người nghiện rượu.
- Người bệnh thiếu máu hồng cầu liềm.
- Ở trẻ em điều trị hỗ trợ chứng khó đọc.
- Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguồn gốc vỏ não.

Liều lượng và cách dùng: Theo chỉ định của bác sĩ

- Liều thường dùng là 30 - 160 mg/kg/ngày, chia đều ngày 2 lần hoặc 3-4 lần.
- Người lớn liều thường 800 mg/ lần, ngày 3 lần. Nếu triệu chứng cải thiện tốt hơn, giảm liều còn 400 mg/ lần, ngày 3 lần.
- Điều trị dài ngày các hội chứng tâm thần thực thể ở người cao tuổi: 1,2 - 2,4 g một ngày, tùy từng trường hợp. Liều có thể cao tới 4,8 g/ngày trong những tuần đầu.
- Điều trị nghiện rượu: 12 g một ngày trong thời gian cai rượu đầu tiên. Điều trị duy trì: 2,4 g/ngày.
- Suy giảm nhận thức sau chấn thương não (có kèm chóng mặt hoặc không): Liều ban đầu là 9 - 12 g/ngày; Liều duy trì: 2,4 g, uống ít nhất trong ba tuần.

- Thiếu máu hồng cầu liềm: 160 mg/kg / ngày, chia đều làm 4 lần.
- Điều trị giật rung cơ: Piracetam được dùng với liều 7,2 g/ngày, chia làm 2 - 3 lần. Tùy theo đáp ứng, cứ 3 - 4 ngày một lần, tăng thêm 4,8 g mỗi ngày cho tới liều tối đa là 20 g/ngày. Sau khi đã đạt liều tối ưu của Piracetam, nên tìm cách giảm liều của các thuốc dùng kèm.

Chống chỉ định:

- Người bệnh suy thận nặng (hệ số thanh thải Creatinin dưới 20 ml/ phút).
- Người mắc bệnh Huntington.
- Người bệnh suy gan.
- Không nên sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Tác dụng phụ và phản ứng có hại:

- Thường gặp: Mệt mỏi; Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, trướng bụng. Bồn chồn, dễ bị kích động, nhức đầu, mất ngủ, ngứa gãi.
- Ít gặp: Chóng mặt, run, kích thích tình dục.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc:

Khi dùng thuốc cho người suy thận. Cần theo dõi chức năng thận ở những người bệnh này và người bệnh cao tuổi (Khi cần điều chỉnh liều dựa vào hệ số thanh thải của creatinin).

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



AGIMEXPHARM

Sản xuất tại: CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM


27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
Nhà máy: K. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.
ĐT: 076.3857300 - 3856966 Fax: 076.3857301

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

24 Đường số 3, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q11, TP. HCM
ĐT: 08.39624777 - 39624888 Fax: 08.39624999
Email: agimexpharmcnhcm@gmail.com

Trang 2

TP Long Xuyên, ngày 19 tháng 06 năm 2014



DS. Phạm Thị Bích Thủy