

AGICLOVIR 5%

Thành phần: Mỗi tuýp 5g chứa:

- Aciclovir 0,25g
- Tá dược vđ 5g.

Chỉ định:

Các trường hợp nhiễm *Herpes simplex* trên da và niêm mạc, nhiễm *Herpes zoster*, *Herpes* sinh dục, *Herpes* môi khởi phát và tái phát.

Liều lượng và cách dùng:

- Thoa thuốc lên vùng da bị nhiễm, 5 - 6 lần/mỗi ngày, cách nhau 4 giờ 1 lần.
- Việc điều trị nên kéo dài liên tục trong 5 - 7 ngày. Nếu chưa khỏi, có thể tiếp tục cho đến 10 ngày.
- Việc điều trị nên bắt đầu càng sớm càng tốt khi thấy xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Tác dụng phụ và phản ứng có hại:

Cảm giác rất bỏng hay đau nhói thoáng qua có thể xảy ra khi bôi Aciclovir.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thận trọng khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc:

- Khi sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
- Không nên dùng thuốc mỡ Aciclovir khi không có các dấu hiệu và triệu chứng bệnh lý.
- Không nên dùng thuốc mỡ Aciclovir để phòng ngừa nhiễm tái phát virus *Herpes simplex*.
- Không bôi thuốc mỡ Aciclovir vào vùng niêm mạc như ở miệng hay âm đạo có thể gây kích ứng.
- Thuốc mỡ Aciclovir chỉ nhằm để bôi ngoài da và không nên dùng cho mắt.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



AGIMEXPHARM

Sản xuất tại: **CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

24 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Nhà máy: K. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

ĐT: 076.3857300 - 3856966 Fax: 076.3857301

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

24 Đường số 3, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, TP. HCM

ĐT: 08.39624777 - 39624888 Fax: 08.39624999


Email: agimexpharmcnhcm@gmail.com



Nguyen
14/8/14

Trang 2

TP Long Xuyên, ngày 19 tháng 06 năm 2014



TI GIÁM ĐỐC
PGD Quản lý chất lượng

DS. Phạm Thị Bích Thủy