

MEBENDAZOL



Thành phần:

- Mebendazol 500mg
- Tá dược vđ 1 viên.

Chỉ định:

Mebendazol được lựa chọn để điều trị nhiễm một hoặc nhiều loại giun, như giun tóc, giun đũa, giun kim, giun Capillaria philippinensis hoặc giun móc.

Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn và trẻ em trên 2 tuổi: Nhai 1 viên duy nhất 500 mg.
- Dùng lặp lại mỗi 4 - 6 tháng để tẩy giun định kỳ.

Chống chỉ định:

- Mebendazol không nên dùng cho người mang thai 3 tháng đầu
- Người bị bệnh gan
- Những người quá mẫn với Mebendazol.
- Trẻ em dưới 2 tuổi.

Tác dụng phụ và phản ứng có hại:

- > Ít gặp, 1/1000 <ADR < 1/100
- Toàn thân: Chóng mặt.
- Tiêu hóa: đau bụng, tiêu chảy.
- Có trường hợp giun đũa bò ra mồm và mũi.
- > Hiếm gặp, ADR < 1/1000
- Da: Ngoại ban, mày đay và phù mạch.

Nguyen
11/18/14



AGIMEXPHARM

Sản xuất tại: **CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**
27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.
Nhà máy: K. Thanh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.
ĐT: 076.3857300 - 3856966 Fax: 076.3857301

- Co giật.
- > Hướng dẫn cách xử trí ADR
- Phải giảm liều ở người có tổn thương gan.
- Khi dùng Mebendazol liều cao, phải tiến hành theo dõi đều đặn nồng độ transaminase trong huyết thanh, số lượng bạch cầu và tiểu cầu.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thời kỳ mang thai:
Do chưa xác định được tính an toàn khi dùng mebendazol cho người mang thai; vì vậy về nguyên tắc không nên dùng cho người mang thai, nhất là trong ba tháng đầu thai kỳ.
- Thời kỳ cho con bú:
Còn chưa rõ mebendazol có tiết vào sữa mẹ không, nhưng vẫn cần thận trọng khi dùng mebendazol trong thời kỳ cho con bú.

Những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc:

- Người bệnh cần được thông báo về nguy cơ có thể xảy ra cho thai nhi như ở người mang thai dùng Mebendazol (xin đọc phần Thời kỳ mang thai).
- Đã có một số ít thông báo về giảm bạch cầu trung tính và rối loạn chức năng gan, kể cả viêm gan khi dùng kéo dài mebendazol và dùng liều cao hơn liều khuyến cáo.
- Cần thông báo cho người bệnh giữ vệ sinh để phòng ngừa tái nhiễm và lây lan bệnh.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

24 Đường số 3, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q11, TP. HCM
ĐT: 08.39624777 - 39624888 Fax: 08.39624999
Email: agimexpharmcnhcm@gmail.com

Trang 2

TP Long Xuyên, ngày 19 tháng 06 năm 2014

PGD Quản lý chất lượng
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM
TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG

DS. Phạm Thị Bích Thủy