

Smecgim®

Thành phần:

- Dioctahedral smectite 3g
- Tá dược vđ 1 gói.

Chỉ định: Điều trị

- Tiêu chảy cấp và mạn cho người lớn và trẻ em.
- Chứng đau do bệnh ở thực quản - dạ dày và ruột.

Liều lượng và cách dùng:

- Trẻ em:
 - Dưới 1 tuổi: Uống 1 gói/ ngày.
 - Từ 1 - 2 tuổi: Uống 1 - 2 gói/ ngày.
 - Trên 2 tuổi: Uống 2 - 3 gói/ ngày.
- Người lớn: Trung bình 3 gói/ ngày.
- Chia 2 - 3 lần trong ngày, hòa thuốc với một ít nước trước khi dùng. Nên uống xa bữa ăn hoặc uống sau bữa ăn ở bệnh viêm thực quản.
- Thông thường nếu tiêu chảy cấp tính, liều khởi đầu có thể tăng gấp đôi.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Tác dụng phụ và phản ứng có hại:

- Có thể gây ra hoặc làm tăng tình trạng táo bón nhưng rất hiếm, điều trị vẫn có thể tiếp tục với liều lượng giảm.
- Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.



Những điều cần tránh, lưu ý khi sử dụng thuốc:

Phải bù nước nếu cần (bằng đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch) tùy theo tuổi, cơ địa bệnh nhân và mức độ mất nước do tiêu chảy.

Tương tác thuốc:

Tính chất hấp phụ của Dioctahedral smectite có thể làm thay đổi thời gian và (hoặc) sự hấp thu của thuốc khác khi sử dụng cùng lúc, do đó nên uống cách khoảng với Dioctahedral smectite.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng



AGIMEXPHARM

Sản xuất tại: **CTY CP DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM**

27 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

Nhà máy: K. Thạnh An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang.

ĐT: 076.3857300 - 3856966 Fax: 076.3857301

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


24 Đường số 3, Cư Xá Bình Thới, P.8, Q.11, TP. HCM

ĐT: 08.39624777 - 39624888 Fax: 08.39624999

Email: agimexpharmcnhcm@gmail.com

Trang 2

TP Long Xuyên, ngày 19 tháng 06 năm 2014



TL. GIÁM ĐỐC

PGD. Quản lý chất lượng

ĐS. Phạm Thị Bích Thủy