

21/5/14



SPK: VD-19726-13

Nautamine® Chống say tàu xe hiệu quả

- **Vỉ 4 viên tiện lợi**
- **Dùng được cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên**

Chỉ cần uống Nautamine trước khi khởi hành 30 phút.

THÔNG TIN SẢN PHẨM: DẠNG TRÌNH BÀY: Viên nén dễ bẻ, hộp 20 vỉ, vì 4 viên. **THÀNH PHẦN:** Di(acefylline) diphenhydramine 90 mg, tá dược vừa đủ 1 viên. **CHỈ ĐỊNH:** Nautamine là một thuốc kháng histamine: diphenhydramine. Nautamine được chỉ định dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi để phòng ngừa và điều trị say tàu xe. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Glaucoma (tăng nhãn áp), tiểu khó do bệnh lý tuyến tiền liệt và nguyên nhân khác; quá mẫn với các thuốc kháng histamine; trẻ em dưới 2 tuổi. **LIỀU LƯỢNG:** *Người lớn hoặc trẻ em trên 12 tuổi:* 1-1,5 viên /lần, không quá 6 viên/ngày. *Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi:* 1 viên/lần, không quá 4 viên/ngày. *Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi:* Nghiền ¼ hoặc ½ viên hòa với ít nước. Dùng ½ viên/lần, không quá 2 viên/ngày. **CÁCH DÙNG:** uống thuốc nửa giờ trước khi đi tàu xe và lặp lại sau 6 giờ nếu cần. **THẬN TRỌNG:** - Bệnh gan - thận lâu ngày cần báo cho bác sĩ để điều chỉnh liều dùng. - Người già chỉ nên dùng thuốc khi có ý kiến của bác sĩ. Thuốc có thể gây táo bón, chóng mặt, ngủ gà, bệnh tuyến tiền liệt. - Thuốc có thể gây chóng mặt, đặc biệt khi dùng chung với cồn: không uống rượu hoặc dùng thuốc, thức uống chứa rượu trong thời gian dùng thuốc. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Thuốc có chứa chất kháng histamine: diphenhydramine. Không nên dùng kết hợp với các thuốc có chứa chất này để bảo đảm không quá liều tối đa cho phép. **LÚC CÓ THAI – THỜI KỲ ĐANG CHO CON BÚ:** - *Có thai:* Có thể dùng thuốc này trong thời gian mang thai, chỉ dùng một vài ngày với liều khuyến cáo. - *Cuối thai kỳ:* việc sử dụng quá mức thuốc này có thể ảnh hưởng cho trẻ sơ sinh. - *Thời kỳ đang cho con bú:* không dùng cho phụ nữ cho con bú. **LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Lưu ý các tài xế vì nguy cơ bị lơ mơ, giảm tỉnh táo khi sử dụng thuốc này. Hiện tượng này tăng thêm khi uống rượu. **TÁC DỤNG NGOẠI Ý:** - Phản ứng dị ứng (phát ban ngoài da, phù Quincke, sốc quá mẫn). - Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu. - Lơ mơ, giảm tỉnh táo, giảm tập trung, chóng mặt. - Điều khiển máy móc kém, run. - Lẫn lộn, ảo giác. - Khô miệng, loạn thị, bí tiểu, đánh trống ngực, hạ huyết áp. **NHÀ SẢN XUẤT:** Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam, 123 Nguyễn Khoái, Q.4, TP.HCM. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** **THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:** Sanofi-Aventis, 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM. ĐT: (84 8) 38298526. Fax: (84 8) 39144801. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục QLĐ:/...../QLĐ-TT, ngày .../.../..... In tài liệu ngày .../.../..... VN.DPH.14.03.01



Mẫu 8