



Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

Strepsils®

Warm
hương gừng



Thành phần:

Mỗi viên ngâm chứa:

Hoạt chất: 2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1,2mg, Amylmetacresol 0,6mg.

Tá dược: Acid Tartaric, Anthocyanins (E163), Fruity Plum Flavour, Soothing Cream Flavour, Warm Sensation Flavour, Warm Ginger Spice Flavour, Medium chain triglyceride, Liquid sucrose, Liquid glucose.

Dạng bào chế: Viên ngâm

Chỉ định: Strepsils Warm là viên ngâm kháng khuẩn để làm giảm triệu chứng của viêm họng.

Liều lượng và cách dùng: Dùng đường uống.

Người lớn và trẻ em (trên 6 tuổi): Ngâm 1 viên để tan chậm trong miệng cách khoảng 2 đến 3 giờ, sử dụng tối đa 12 viên trong 24 giờ. Người cao tuổi: Không cần điều chỉnh liều đối với nhóm tuổi này. Không thích hợp cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Chống chỉ định: Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dụng

Nếu có bất kỳ triệu chứng nào xảy ra, hỏi ý kiến bác sĩ. Bệnh nhân có các vấn đề về di truyền hiếm gặp như không dung nạp fructose, kèm phần thu glucose-galactose hoặc thiếu sucrose-isomaltase thì không nên dùng thuốc này.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Độ an toàn của viêm ngấm Stepsils đối với phụ nữ có thai và cho con bú chưa được thiết lập đầy đủ, nhưng tiên-đoán là không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng như đối với các thuốc khác, cần thận trọng sử dụng trong khi có thai và cho con bú.

Tác động khi lái xe và sử dụng máy móc: Không có ảnh hưởng nào được ghi nhận.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác: Không có dấu hiệu lâm sàng của tương tác nào được ghi nhận.

Tác dụng không mong muốn:

Chưa ghi nhận tác dụng phụ hoặc phản ứng có hại nào. Trong trường hợp hiếm, đã gặp các rối loạn như "tiêu chảy và khó chịu ở dạ dày", "viêm ngấm làm đau lưỡi" v.v.. mặc dù chúng không theo một dạng đặc trưng nào. Các triệu chứng của hiện tượng này đã được nhận biết khi xảy ra ở một tỷ lệ bệnh nhân dưới dạng phản ứng giả được sau khi dùng viên lactose (Beecher, J Am Assn 1995, 159, 1602, Wolf và Pinsky, J Am Med Assn, 1954, 155, 399).

Phản ứng dị ứng hiếm khi xảy ra.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Quá liều: Triệu chứng của quá liều chỉ liên quan đến các khó chịu ở đường tiêu hóa.

Điều trị: Điều trị triệu chứng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30° C.

Để thuốc xa tầm tay của trẻ em. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng đã ghi trên bao bì.

Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên ngấm. Hộp 50 gói x 2 viên ngấm

Nhà sản xuất:

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited.
Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire, NG90 2DB, United Kingdom.

Nhà đóng gói:

Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.
65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand.

Hiệu chỉnh: Tháng 10, 2011

18/10/2014
[Signature]

