

Tên: Thành phần: Cho 1 viên nén sủi bọt: Calcium lactat gluconat canxi. **Dạng bào chế:** Viên nén sủi bọt. **Chỉ định:** Thuốc này chứa canxi. (cho người trưởng thành, thai kỳ, cho con bú). • Để điều trị hỗ trợ tình trạng mất canxi ở người dùng liệu pháp corticoid, hoặc trong giai đoạn phục hồi vận động sau một thời gian nằm trên 6 tuổi. Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 2 viên/ngày. Trẻ em từ 6-10 tuổi: 1 viên/ngày. Không được nuốt hoặc nhai viên thuốc. **Tác dụng không mong muốn:** dị ứng nghiêm trọng như sưng tấy mặt, môi, lưỡi, và/hoặc họng, có thể tiến triển thành sốc phản vệ, đau bụng, táo bón, đầy hơi, nôn mửa, ngứa, ban đỏ và/hoặc nóng, tăng canxi máu (tăng canxi huyết) hoặc thải trừ canxi qua đường tiểu nhiều. **Thành phần của thuốc:** • Tăng canxi huyết • Tăng canxi niệu • Sỏi canxi • Tăng canxi niệu. **Thận trọng:** • Bệnh nhân suy thận: cần kiểm tra hàm lượng natri (275 mg trong mỗi viên nén sủi bọt) khi sử dụng cho bệnh nhân suy thận. Nên chờ ít nhất 2 giờ giữa thời điểm uống các chế phẩm thuốc chứa biphosphonat và Calcium Sandoz. **Lưu ý đặc biệt:** Uống quá nhiều canxi có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân không dung nạp với fructose, hoặc kém hấp thu glucose và các chất khác (như về chuyển hóa hiếm gặp). **Có thai hoặc cho con bú:** Nên hỏi ý kiến bác sĩ về liều canxi, bác sĩ của bạn có thể kê toa cho bạn thuốc này trong thời gian

Nguyen
30/5/14

Sandoz Pharma (Pakistan) Ltd., Petaro Road, Jamshoro, Pakistan. **Thông tin liên lạc:** Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 08 3910 2650.