


Janumet™

sitagliptin/metformin

**KHỞI TRỊ VỚI Sitagliptin/Metformin: HIỆU QUẢ GIẢM HbA_{1c},
TỐI 3.3% Ở PHÂN NHÓM CÓ MỨC HbA_{1c} BAN ĐẦU >9.7%⁽¹⁾**



Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, nhóm song song, kiểm soát trong 18 tuần (kết quả chính) và tiếp tục 26 tuần đánh giá hiệu quả và tính an toàn của Sitagliptin/Metformin (phối hợp liều cố định ≥50/500 - ≤50/1000 ngày 2 lần) so sánh với Metformin đơn trị (≥500 - ≤1000 mg ngày 2 lần) trên 1250 bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 (không sử dụng thuốc hạ đường huyết trong suốt 4 tuần trước khi sàng lọc) chưa kiểm soát chế độ ăn và luyện tập (HbA_{1c} ≥7.5%).

Tiêu chí chính là sự thay đổi HbA_{1c} so với ban đầu sau 18 tuần trên nhóm bệnh nhân sử dụng Metformin và nhóm bệnh nhân sử dụng Sitagliptin/Metformin. Dữ liệu trình bày từ các kết quả tuần thứ 18. Ngoài ra phân tích mức thay đổi HbA_{1c} so với ban đầu theo phân nhóm HbA_{1c} với mức HbA_{1c} trung vị ban đầu 9.7%.



TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1. Reasner C, Olansky L, Seck TL, et al. The effect of initial therapy with the fixed-dose combination of sitagliptin and metformin compared with metformin monotherapy in patients with type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Obes Metab.* 2011;13(7):644-652.