




onglyza[®]

saxagliptin Viên 5 mg

Phối hợp saxagliptin đái tháo đường tý

Đường huyết đói + Đường huyết sau ăn $\Rightarrow$ HbA1c³

Mức độ đóng góp tương ứng của đường huyết sau ăn và đường huyết đói (%) đến tình trạng tăng đường huyết trong ngày



* $p < 0.001$ so sánh sự đóng góp của đường huyết sau ăn ở các phân nhóm HbA1c

* $p < 0.001$ so sánh sự đóng góp của đường huyết đói ở các phân nhóm HbA1c

Hiệu quả kiểm soát đường huyết đói và đường huyết sau ăn²

	Đường huyết đói*	Đường huyết sau ăn (2 giờ)*
Tăng liều Glyburide + Giả dược	+1 mg/dL (+0,05 mM/L)	+8 mg/dL (+0,4 mM/L)
Saxagliptin 5 mg + Glyburide 7,5 mg	-10 mg/dL (-0,55 mM/L)	-34 mg/dL (-1,88 mM/L)

*mM/L = 0,0555 mg/dL⁵

n=517

Đường huyết đói: $p=0,002$ sv tăng liều glyburide + giả dược

Đường huyết sau ăn: $p<0,0001$ sv tăng liều glyburide + giả dược

Liều glyburide trung bình cuối cùng 15 mg, ngày 1 lần

Tần suất biến cố hạ đường huyết ở nhóm điều trị saxagliptin tăng liều glyburide + giả dược (0,7%; n=2)

Nghiên cứu pha 3, 24 tuần, đa trung tâm, đa quốc gia, ngẫu nhiên, mù đôi, có kiểm chứng trên bệnh nhân đái tháo đường tý 2 chưa được kiểm soát đường huyết ($7,5\% \leq \text{HbA1c} \leq 10\%$) với đơn trị liệu glyburide 7,5 mg ngày một lần²