



Phối hợp Saxagliptin với insulin cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 chưa kiểm soát được với insulin (có hoặc không phối hợp với Metformin)¹

HbA1c giảm 0,73% so với ban đầu¹



Tăng trung bình tổng liều insulin hàng ngày thấp hơn ở nhóm sử dụng Saxagliptin¹



Hiệu quả kiểm soát đường huyết đói và đường huyết sau ăn¹

	Đường huyết đói*	Đường huyết sau ăn (2 giờ)*
Giả dược + insulin (n=151)	-6,06 mg/dL (-0,33 mM/L)	-4,2 mg/dL (-0,23 mM/L)
Saxagliptin + Insulin (n=304)	-10,08 mg/dL (-0,56 mM/L)	-27,2 mg/dL (-1,5 mM/L)

*mM/L = 0,0555 mg/dL⁵

Đường huyết đói: p= 0,3958 so với Giả dược + insulin

Đường huyết sau ăn: p=0,0016 so với Giả dược + insulin

Tần suất biến cố hạ đường huyết ở bệnh nhân được điều trị với Saxagliptin + insulin là 5,3%; n=304 và ở bệnh nhân điều trị với giả dược + insulin là 3,3%; n=151¹

Thiết kế: Nghiên cứu 24 tuần, mù đôi, ngẫu nhiên, đối chứng với giả dược trên 455 bệnh nhân đái tháo đường type 2 chưa kiểm soát tốt đường huyết ($7.5\% < \text{HbA1c} < 11\%$) với đơn trị liệu insulin hoặc phối hợp insulin + Metformin¹
Tiêu chí chính: Thay đổi HbA1c so với ban đầu ở tuần 24¹