




onglyza[®]

saxagliptin Viên 5 mg

Phối hợp saxagliptin
đái tháo đường type 2

Đường huyết đói + Đường huyết sau ăn $\Rightarrow$ HbA1c³

Mức độ đóng góp tương ứng của đường huyết sau ăn và đường huyết đói (%) đến tình trạng tăng đường huyết trong ngày



* $p < 0,001$ so sánh sự đóng góp của đường huyết sau ăn ở các phân nhóm HbA1c
* $p < 0,001$ so sánh sự đóng góp của đường huyết đói ở các phân nhóm HbA1c

Hiệu quả kiểm soát đường huyết đói và đường huyết sau ăn²

Đánh giá mức thay đổi đường huyết

	Đường huyết đói*	Đường huyết sau ăn (2 giờ)*
Giả dược + Metformin	1,2 mg/dL (0,06 mM/L) (n=176)	-18 mg/dL (-0,1 mM/L) (n=135)
Saxagliptin 5 mg + Metformin	-22 mg/dL (-1,2 mM/L) (n=187)	-58,2 mg/dL (-3,2 mM/L) (n=155)

*mM/L = 0,0555 mg/dL⁵
Đường huyết đói: $p < 0,0001$, n=363
Đường huyết sau ăn: $p < 0,0001$, n=290

Tần suất biến cố hạ đường huyết ở bệnh nhân điều trị với saxagliptin + Metformin

Nghiên cứu 24 tuần, mù đôi, ngẫu nhiên, đối chứng với giả dược trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 chưa được kiểm soát đường huyết ($7\% \leq \text{HbA1c} \leq 10\%$) với đơn trị liệu Metformin²