XYLOBALAN 0.1%
DÀNH CHO NGƯỜI LỚN

- Thông mũi sau ít phút
- Hiệu quả suốt 10 giờ

- Dùng được cho trẻ trên 3 tháng tuổi. Sử dụng theo chỉ định của bác sĩ hoặc dưới sự giám sát của người lớn.

XYLOBALAN 0.05% DÀNH CHO TRẺ EM

THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM

1. THÀNH PHẦN:

Trong 1ml dung dịch
XyloBalan 0.1%
Hoạt chất: Xylometazoline hydrochloride:..... 1mg
Tá dược: ..... vừa đủ
XyloBalan 0.05%
Hoạt chất: Xylometazoline hydrochloride: ..... 0.5mg.
Tá dược: ..... vừa đủ

2. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:

- Xylometazoline là một dẫn chất imidazoline có tác dụng kích thích thụ thể α- adrenergic của hệ thần kinh giao cảm. Thuốc gắn trực tiếp vào niêm mạc làm co mạch, giảm tiết chất nhầy, giảm phù nề.

3. CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Tác dụng của thuốc bắt đầu sau 5- 10 phút và duy trì trong 10 giờ. Thuốc gắn trực tiếp vào niêm mạc mũi họng gây co mạch tại chỗ, thường không được hấp thu vào cơ thể với số lượng đáng kể nên không gây ra các tác dụng toàn thân.

4.CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

Thuốc được sử dụng điều trị hỗ trợ trong các trường hợp

- Viêm mũi cấp do vi khuẩn hoặc virut
- Viêm xoang
- Viêm mũi dị ứng
- Viêm tai giữa cấp

5.LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

XyloBalan 0.1%: dùng cho người lớn và trẻ em trên 12 tuổi

- Nhỏ 2 - 3 giọt vào mỗi bên mũi, mỗi lần cách nhau từ 8 – 10 giờ
- Nhỏ từ 1 - 3 lần/ngày.

Không sử dụng XyloBalan 0.1% quá 3-5 ngày
XyloBalan 0.05%: dùng cho trẻ em từ 3 tháng - 12 tuổi.

- Nhỏ 1 giọt vào mỗi bên mũi, mỗi lần cách nhau từ 8 – 10 giờ
- Nhỏ từ 1 - 3 lần/ngày

Trẻ em từ 3 tháng - 2 tuổi chỉ sử dụng khi có ý kiến của bác sĩ, không sử dụng XyloBalan 0.05% quá 3-5 ngày

6.CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Bệnh nhân sau khi cắt bỏ tuyến yên, sau các phẫu thuật có liên quan đến sự bộc lộ màng cứng.
- Trẻ em dưới 12 tuổi với XyloBalan 0.1%
- Trẻ em dưới 3 tháng tuổi với XyloBalan 0.05%
- Phụ nữ có thai và cho con bú

7. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

- Tác dụng tại chỗ: khô niêm mạc mũi thường xuất hiện, hiếm khi bệnh nhân bị kích ứng niêm mạc mũi, cảm giác nóng ở mũi và họng, hắt hơi.
- Rất hiếm khi xuất hiện các triệu chứng và dấu hiệu ảnh hưởng toàn thân như: buồn nôn, đau đầu, yếu, mệt mỏi, uể oải, rối loạn thị giác, có các phản ứng dị ứng (khó thở, phù mạch) và đánh trống ngực, tim đập nhanh, tăng huyết áp động mạch (đặc biệt ở các bệnh nhân bị bệnh tim mạch).
- Khi sử dụng thuốc trong thời gian dài hoặc dùng sai liều khuyến cáo, viêm mũi thứ cấp do dùng thuốc hoặc viêm mũi do teo khô niêm mạc mũi có thể phát triển
- Sau khi sử dụng quá liều, sử dụng thuốc không đúng cách, như việc vô tình uống nhầm thuốc ở trẻ em, sự trầm cảm quá mức có thể xuất hiện, do sự tiêu hóa và hấp thụ hoạt chất trong đường dạ dày và ruột

8. LƯU Ý VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC

- Với XyoBaln 0.05% Trẻ em có thể bộc lộ trạng thái lo âu hoặc rối loạn giấc ngủ. Nếu các triệu chứng này phát triển, cần ngưng sử dụng thuốc
- Đặc biệt thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân mẫn cảm với các chất giống giao cảm, biểu hiện như mất ngủ, run, loạn nhịp tim và tăng huyết áp động mạch.
- Không nên sử dụng XyloBalan cho những bệnh nhân viêm mũi mãn tính hoặc viêm mũi do vận mạch vì thuốc chỉ được sử dụng không quá 2 tuần
- Sử dụng cẩn thận cho các bệnh nhân tăng huyết áp động mạch viêm họng và các bệnh về tim mạch khác, glocom góc đóng, Tăng sản tuyến tiền liệt, tăng năng tuyến giáp
- Không sử dụng liều cao hơn liều khuyến cáo, đặc biệt với trẻ em và người già.

9. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản thuốc trong bao bì kín ở nhiệt độ không quá 25
- Tránh ánh sáng trực tiếp.

10. HẠN SỬ DỤNG: 4 năm kể từ ngày sản xuất
11. LƯU Ý: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Vì lý do vệ sinh, mỗi lọ thuốc chỉ nên sử dụng cho một bệnh nhân

12. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
13. SỐ VISA: VN-8403-09 và NV-8504-09

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP PHONG
M.S.D.N: 0101041838 - C.T.N.H.H - THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

2715/14