

PHỔ KHÁNG KHUẨN:

Vi Khuẩn Gram Dương	Vi Khuẩn Gram Âm	Vi Khuẩn Yếm Khí
<i>Enterococcus avium</i> <i>Enterococcus casseliflavus</i> <i>Enterococcus faecalis</i>* (bao gồm các chủng nhạy cảm với vancomycin) <i>Enterococcus faecalis</i> (bao gồm các chủng kháng vancomycin) <i>Enterococcus faecium</i> (bao gồm các chủng nhạy cảm và kháng vancomycin) <i>Enterococcus gallinarum</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Staphylococcus aureus</i>* (bao gồm các chủng nhạy cảm và kháng methicillin) MRSA & MSSA <i>Staphylococcus epidermidis</i> (bao gồm các chủng nhạy cảm và kháng methicillin) <i>Staphylococcus haemolyticus</i> <i>Streptococcus agalactiae</i>* <i>Streptococcus anginosus</i>* (bao gồm <i>S. anginosus</i>, <i>S. intermedius</i>, <i>S. constellatus</i>) <i>Streptococcus pyogenes</i>* <i>Streptococcus pneumoniae</i>* (các chủng phân lập nhạy cảm với penicillin) <i>Streptococcus pneumoniae</i> (các chủng phân lập kháng penicillin) Viridans nhóm streptococci	<i>Acinetobacter calcoaceticus/baumannii complex</i> <i>Aeromonas hydrophila</i> <i>Citrobacter freundii</i>* <i>Citrobacter koseri</i> <i>Enterobacter aerogenes</i> <i>Enterobacter cloacae</i>* <i>Escherichia coli</i>* (bao gồm các chủng sinh ESBL) <i>Haemophilus influenzae</i>* <i>Haemophilus parainfluenzae</i> <i>Klebsiella oxytoca</i>* <i>Klebsiella pneumoniae</i>* (bao gồm các chủng sinh ESBL) <i>Klebsiella pneumoniae</i> (bao gồm các chủng sinh AmpC) <i>Legionella pneumophila</i>* <i>Moraxella catarrhalis</i>* <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Neisseria meningitidis</i> <i>Pasteurella multocida</i> <i>Salmonella enterica ser. Enteritidis</i> <i>Salmonella enterica ser. Paratyphi</i> <i>Salmonella enterica ser. Typhi</i> <i>Salmonella enterica ser. Typhimurium</i> <i>Shigella boydii</i> <i>Shigella dysenteriae</i> <i>Shigella flexneri</i> <i>Serratia marcescens</i> <i>Shigella sonnei</i> <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	<i>Bacteroides fragilis</i>* <i>Bacteroides distasonis</i> <i>Bacteroides ovatus</i> <i>Bacteroides thetaiotaomicron</i>* <i>Bacteroides uniformis</i>* <i>Bacteroides vulgatus</i>* <i>Clostridium difficile</i> <i>Clostridium perfringens</i>* <i>Peptostreptococcus spp.</i> <i>Peptostreptococcus micros</i>* <i>Porphyromonas spp.</i> <i>Prevotella spp.</i> Vi khuẩn không điển hình: <i>Chlamydia pneumoniae</i>* <i>Mycobacterium abscessus</i> <i>Mycobacterium chelonae</i> <i>Mycobacterium fortuitum</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i>* <i>Nguyen</i> 18/6/14

LIỀU DÙNG

Liều Ban Đầu Của Tigecyclin Là 100mg	Liều Tiếp Theo 50mg Mỗi 12 Giờ
Truyền tĩnh mạch trong vòng 30 đến 60 phút	
Thời gian điều trị là 5 đến 14 ngày	
Không cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận hoặc đang thẩm phân máu. Không cần hiệu chỉnh liều trên bệnh nhân suy gan nhẹ đến trung bình (Child Pugh A và Child Pugh B). Không cần hiệu chỉnh liều khi sử dụng thuốc cho người cao tuổi.	