

khí sử dụng thuốc
khó thở, và đỏ bừng mặt; choáng phần vè. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp phải
không mong muốn < 1/1000): da nổi ban, mảy ngứa; phản ứng quá mẫn: phù mạch, tức ngực,
loàn giấc ngủ (như ác mộng và mất ngủ); Tiêu hóa: khó miêng, đau bụng. Hiếm gặp (tác dụng
hấp trên... ít gặp (1/1000 < tác dụng không mong muốn < 1/100): Thần kinh: căng thẳng sợ hãi; rối
ngủ, chóng mặt; Tiêu hóa: buồn nôn, khó tiêu; Khác: nhiễm virus, đau bụng kinh, nhiễm khuẩn hô
Thường gặp (tác dụng không mong muốn > 1/100): Thần kinh: buồn ngủ, mệt mỏi, đau đầu, mất
mong muốn không liên quan đến liều dùng và tương tác nhóm tuổi, giới tính, chủng tộc.
mong ở nhóm người dùng fexofenadin tương tự nhóm dùng placebo. Tỷ lệ tác dụng không
MONG MUỐN (ADR) Trong các nghiên cứu lâm sàng có kiểm soát, tỷ lệ tác dụng không
ĐINH Quả mẫn cảm với fexofenadin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. **TÁC DỤNG KHÔNG**
bệnh nhân có suy chức năng thận được khuyến nghị là 60 mg uống 1 lần mỗi ngày. **CHÔNG CHỈ**
60 mg uống 2 lần mỗi ngày hoặc 120-180 mg uống ngày 1 lần với nước. Liều khởi đầu cho những
theo mùa và bệnh nổi mảy ngứa mạn tính ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Liều đề nghị
ở căn ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG** Viêm mũi dị ứng
được chỉ định điều trị các biểu hiện ngoài da không biến chứng trong bệnh nổi mảy ngứa mạn tính
họng, tai và mắt. Bệnh nổi mảy ngứa mạn tính ở căn Viên USALLERZ® (fexofenadin hydroclorid)
như: - Đỏ mắt, ngứa mắt và chảy nước mắt. - Ngột mũi, chảy nước mũi, hắt hơi. - Ngứa miêng,
điều trị các triệu chứng trong viêm mũi dị ứng theo mùa ở người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên
định **HỖN HỢP PHÂN**: Viên mủi dị ứng theo mùa Viên USALLERZ® (fexofenadin hydroclorid) được chỉ định
Mỗi viên nén bao phim chứa: Fexofenadin Hydroclorid 120 mg Tã được: vđ 1 viên.



USALLERZ 120
Fexofenadin hydroclorid 120mg

AMPHARCO U.S.A

GIẢI PHÁP CHO VIÊM MŨI DỊ ỨNG & MÀY ĐAY MẠN TÍNH



Điều trị hiệu quả các triệu chứng viêm mũi dị ứng theo mùa⁽¹⁾

Điều trị hiệu quả các triệu chứng mày đay (mề đay) tự phát mạn tính

Thông tin chi tiết sản phẩm xin xem mặt sau

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: QLD-TT, ngày/...../.....
Ngày/...../..... in tài liệu

ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC Tuy viên fexofenadin không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc nhưng nếu bệnh nhân cảm thấy có thể bị ảnh hưởng, nên tránh lái xe hoặc thực hiện các hoạt động đòi hỏi phải tỉnh táo. **CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG** Tuy fexofenadin không có tác dụng phụ trên tim mạch, nhưng vẫn cần phải thận trọng theo dõi khi dùng fexofenadin cho người đã có nguy cơ tim mạch hoặc đã có khoảng QT kéo dài từ trước. Cần chỉnh liều thích hợp khi dùng liều khởi đầu cho bệnh nhân suy thận do tăng khả dụng sinh học và thời gian bán hủy của thuốc trên các bệnh nhân này. Cần thận trọng khi chọn liều và theo dõi chức năng thận cho người cao tuổi thường có suy giảm sinh lý chức năng thận. Độ an toàn và tính hiệu quả của thuốc ở trẻ em dưới 6 tháng chưa xác định được. Cần ngưng dùng fexofenadin ít nhất 24-48 giờ trước khi tiến hành các thử nghiệm kháng nguyên tiêm trong da. **Thời kỳ mang thai:** Do chưa có đủ nghiên cứu có kiểm chứng trên phụ nữ mang thai, nên chỉ dùng fexofenadin cho phụ nữ mang thai khi lợi ích cho mẹ vượt trội nguy cơ đối với thai nhi. **Thời kỳ cho con bú:** Không rõ fexofenadin có bài tiết qua sữa hay không, vì vậy cần thận trọng khi dùng fexofenadin cho phụ nữ đang cho con bú. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Chú thích: (1) Ralph Mosges, Walter Lehmacher, Norbert Pasch & Julia Vent, Assessment of the anti-obstructive Effect of Fexofenadine on Nasal Allergy Challenge in patients with Seasonal Allergic Rhinitis, Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 2009 27, 1-10.

Sản xuất & Phân phối:
Công ty CP Dược Phẩm AMPHARCO U.S.A
Khu CN Nhơn Trạch 3, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Handwritten signature and date: 7/1/14